

الرياضيات

للفف الخامس العلمي
الفرع الاحيائي

التنقيح

لجنة متخصصة في وزارة التربية

المشرف العلمي على الطبع
حسين صادق العلق

المشرف الفني على الطبع
احمد حافظ كطيش

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq

manahjb@yahoo.com

Info@manahj.edu.iq



f manahjb

manahj

استناداً الى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله في الاسواق

١٤٤٠ هـ / ٢٠١٩ م

الطبعة الحادية عشر



المقدمة :

حاولنا أن نضع بين أيدي أبنائنا الطلبة كتاباً يستطيعون من خلال دراسته متابعة المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه ، وادراك هذه المفاهيم ومن ثم اكتساب المهارات المترتبة عليها وضمن برنامج تنويع التعليم أعدت المديرية العامة للمناهج هذا الكتاب لطلبة الصف الخامس العلمي / الفرع الاحيائي . ويتكون من تسعة فصول تبدأ بالفصل الاول : اللوغارتمات وكيفية استخدام الالة الحاسبة ، أما الفصل الثاني فقد احتوى على المتتابعات، أما الفصل الثالث فقد احتوى على القطوع المخروطية مقتصراً على موضوع الدائرة. وقد احتوى الفصل الرابع على الدوال الدائرية ورسم منحنيات الدوال الدائرية البسيطة، أما الفصل الخامس يتضمن غاية الدالة واستمراريتها.

أما الفصل السادس فقد احتوى على المشتقة والقواعد الاساسية للمشتقة ومشتقات الدوال الدائرية وتضمن الفصل ايضاً على تطبيقات هندسية وفيزيائية ، أما الفصل السابع فقد تضمن تكملة موضوع الهندسة الفراغية واحتوى الفصل الثامن على مبدأ العد والتباديل والتوافيق والاحتمال ونسبة الاحتمال .

وينتهي الكتاب بتقديم المصفوفات وكيفية حل جمل معادلات خطية في متغيرين.

لذا نرجو من الله العلي القدير ان يوفق ابنائنا الطلبة الى مافية الخير لهم ولبلدنا العزيز، ونأمل من زملائنا المدرسين موافاتنا بملاحظاتهم بهدف التطوير... ومنه العون

لجنة التنقيح

Chapter 1


Logarithms اللوغاريتمات

- [1-1] نبذة مختصرة عن اللوغاريتمات .
- [1-2] الدالة اللوغاريتمية .
- [1-3] خواص الدالة اللوغاريتمية .
- [1-4] اللوغاريتمات العشرية .
- [1-5] اللوغاريتمات الطبيعية .
- [1-6] استخدام الآلة الحاسبة .

الرمز أو العلاقة الرياضية	المصطلح
$f(x) = a^x$	الدالة الاسية
$y = \log_a x$	الدالة اللوغاريتمية
$y = \log x$	اللوغاريتمات العشرية
$y = \ln x$	اللوغاريتمات الطبيعية

[1-1] نبذة مختصرة عن اللوغاريتمات

اكتشفت اللوغاريتمات في أوائل القرن السابع عشر من قبل الملاك الاسكتلندي جون نابيير (1550 - 1617م) الذي كان شغوفاً بالرياضيات ومن اهم اعماله استخدام اللوغاريتمات التي ساعدت في تبسيط الحسابات الفلكية المعقدة التي تحتوي في اغلبها عمليتي الضرب والقسمة وتحويلها الى عمليتي الجمع والطرح وكان كتابه ((توصيف قواعد اللوغاريتم المدهشة)) الذي نشره في عام 1614 م . وقد حوى هذا الكتاب اولى الجداول اللوغاريتمية التي استغرق اعدادها 20 سنة. الفكرة الأساس القائمة عليها اللوغاريتمات هي تحويل الاعداد على شكل أس والتعامل معها عوضاً عن الاعداد الاصلية.



واليك بعض المجالات التي تستخدم فيها اللوغاريتمات:

* استخدامه في قياس قوة الزلزال على مقياس ريختر.

* يصف الرقم الهيدروجيني للمادة (PH) درجة حموضة المادة

التي تحسب باستخدام اللوغاريتمات للأساس 10 حيث:

$$\text{PH} = -\log [H^+]$$

H^+ تركيز أيون الهيدروجين في المادة

* يستخدم في قياس شدة الصوت (L) بالديسيبل حيث:

$$L = 10 \log a/a_0$$

a_0 : اقل شدة للصوت تستطيع إذن انسان عادي ان تميزه .

* حساب سرعة الصواريخ (s) حيث:

$$s = -0.0098n + v \ln k$$

n: زمن اشتعال وقود المحرك.

v: سرعة انطلاق البخار كم/ثا.

k: نسبة كتلة الصاروخ محمل بالوقود الى كتلته بدون وقود

Ln: اللوغاريتم الطبيعي.

* في الاحصاء يستخدم في حساب الفائدة المركبة المستمرة R حيث:

$$R = m e^{n \cdot r}$$

m: المبلغ المستثمر.

r: الفائدة.

n: عدد السنوات .

* حساب الوسط الهندسي $\sqrt[n]{(x_1)(x_2)(x_3) \dots (x_n)}$ =

في البنود اللاحقة سندرس اللوغاريتمات العشرية والطبيعية .



Logarithmic Function [1-2] الدالة اللوغاريتمية

لقد درست في الصف الرابع العلمي الدالة الأسية:

وهي دالة تقابل $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{++}$, $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$

ولانها دالة تقابل فلها دالة عكسية (f^{-1}) حيث $f^{-1}: \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$

وهي تقابل ايضاً وتدعى هذه بالدالة اللوغاريتمية


ولتوضح ذلك: الجدول أدناه يمثل بعض الأزواج المرتبة التي تمثل الدالة $y = 2^x$

x	2	1	0	-1
2^x	4	2	1	1/2

بالاعتماد على النقاط :- $\{(2,4), (1,2), (0,1), (-1, \frac{1}{2})\}$ رسمنا المنحني البياني $y = 2^x$

ويمكن رسم المنحني البياني للتقابل العكسي بالاعتماد على نظائر هذه النقاط والتي هي :-

$\{(\frac{1}{2}, -1), (1,0), (2,1), (4,2)\}$



والشكل المجاور يوضح ذلك.

وبصورة عامة يمكن وضع تعريف الدالة اللوغاريتمية بالشكل الآتي :-

الدالة اللوغاريتمية :

يرمز للدالة العكسية للدالة $y = a^x$ بالرمز $x = \text{Log}_a y$ فنقول ان x هو لوغاريتم y للاساس a .

ويمكننا ان نكتب العلاقة الآتية:

$$x = \text{Log}_a y \Leftrightarrow y = a^x$$

$$\forall x \in \mathbb{R} , y \in \mathbb{R}^{++} , a > 0 , a \neq 1$$

مثال 1

اكتب كلا مما يأتي بالصورة اللوغاريتمية:

1. $5^3 = 125$

2. $0.001 = 10^{-3}$

3. $2 = 32^{1/5}$

من المعلوم ان $x = \text{Log}_a y \Leftrightarrow y = a^x$

الحل:

1. $\text{Log}_5 125 = 3$ تكافىء $5^3 = 125$

2. $\text{Log}_{10} 0.001 = -3$ تكافىء $0.001 = 10^{-3}$

3. $\text{Log}_{32} 2 = 1/5$ تكافىء $2 = 32^{1/5}$

مثال 2

اكتب كلا مما يأتي بالصورة الاسية:

1. $\text{Log}_7 49 = 2$

2. $\text{Log}_{\sqrt{2}} 64 = 12$

3. $\text{Log}_{10} 10000 = 4$

من المعلوم ان $\text{Log}_a y = x \Leftrightarrow y = a^x$

الحل:

1. $\text{Log}_7 49 = 2 \Rightarrow 49 = 7^2$

2. $\text{Log}_{\sqrt{2}} 64 = 12 \Rightarrow 64 = (\sqrt{2})^{12}$

3. $\text{Log}_{10} 10000 = 4 \Rightarrow 10000 = 10^4$

[1-3] خواص الدالة اللوغاريتمية

سندرج بعض خواص الدالة اللوغاريتمية:

1. لكل عدد حقيقي موجب لوغاريتم.

2. ليس للعدد الحقيقي السالب لوغاريتم.

3. بما ان الدالة اللوغاريتمية تقابل فان:

$$x = y \Leftrightarrow \text{Log}_a x = \text{Log}_a y, \forall x, y \in \mathbb{R}^{++}$$

4. لما كان $a > 0, a \neq 1$ لكل $x, y \in \mathbb{R}^{++}$ سنقبل القواعد الآتية بدون برهان:

a. $\text{Log}_a (xy) = \text{Log}_a x + \text{Log}_a y$

b. $\text{Log}_a (x/y) = \text{Log}_a x - \text{Log}_a y$

c. $\text{Log}_a x^n = n \text{Log}_a (x), \forall n \in \mathbb{R}$

d. $\text{Log}_a a = 1$

e. $\text{Log}_a 1 = 0$

ملاحظة:

مغالطات قواعد اللوغاريتمات:

$$\begin{aligned} * \log_a(xy) &\neq \log_a x \cdot \log_a y \\ * \log_a(x/y) &\neq \frac{\log_a x}{\log_a y}, y \neq 0 \\ * \log_a x^n &\neq (\log_a x)^n \end{aligned}$$

لاحظ سؤال 3 من تمارين (1-1)

مثال 3

أثبت ان :-

$$\log_2(17/5) - \log_2(34/45) + 2 \log_2(2/3) = 1$$

الحل :

الطرف الايسر:

$$\log_2 17/5 - \log_2 34/45 + \log_2 (2/3)^2$$

بعد الاختصار نحصل على

$$\log_2 \left(\frac{17}{5} \cdot \frac{45}{34} \cdot \frac{4}{9} \right)$$

الطرف الايمن

$$\log_2 2 = 1$$

مثال 4

حل المعادلات الآتية:

$$1. \log_3 x = 4 \quad 2. \log_x 64 = 6 \quad 3. \log_5 1/125 = x \quad 4. \log_x 343 = 3$$

الحل :

$$1. \log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4$$

$$x = 81 \Rightarrow \{81\} = \text{مج}$$

$$2. \log_x 64 = 6 \Rightarrow 64 = x^6 \Rightarrow 2^6 = x^6$$

$$\therefore x = \pm 2$$

$$\{2\} = \text{مج} \quad \text{لماذا؟}$$

$$3. \log_5 1/125 = x \Rightarrow 1/125 = 5^x$$

$$5^{-3} = 5^x \Rightarrow x = -3$$

$$\{-3\} = \text{مج}$$

$$4. \log_x 343 = 3 \Rightarrow 343 = x^3 \Rightarrow 7^3 = x^3$$

$$\therefore x = 7$$

$$\{7\} = \text{مج}$$

مثال 5

أ. جد العدد الذي لوغاريتمه للأساس $(1/4)$ هو (2.5)

ب. جد أساس العدد (0.01) الذي لوغاريتمه (1)

ج. جد لوغاريتم العدد $(1/8)$ للأساس (2)

الحل :

أ. نفرض العدد $x = \text{Log}_{1/4} 2.5$


$$\therefore x = (1/4)^{2.5} \Rightarrow x = 1/(2^2)^{2.5} \Rightarrow x = 1/32$$

ب. نفرض الأساس $x = \text{Log}_x 0.01 = 1$

$$0.01 = x^1 \Rightarrow x = 0.01$$

ج. نفرض اللوغاريتم $x = \text{Log}_2 1/8$

$$1/8 = 2^x \Rightarrow 2^x = 2^{-3} \Rightarrow x = -3$$



تمارين (1-1)

1. جد قيمة x لكل مما يأتي:

a. $\text{Log}_{10} 0.00001 = x$ b. $\text{Log}_x 16 = -4$ c. $\text{Log}_{10} x = 5$

2. اكتب الصورة الأخرى لكل مما يأتي:

a. $\text{Log}_{10} 10000 = 4$ b. $7^3 = 343$ c. $\text{Log}_5 1/25 = -2$ d. $(0.01)^2 = 0.0001$

3. فيما يلي علاقات غير صحيحة دائماً. أعط $x = a$ ، $y = a$ ، حيث $a > 0$ وبين ذلك:

a. $\text{Log}_a (x + y) \neq \text{Log}_a x + \text{Log}_a y$

b. $\text{Log}_a xy \neq \text{Log}_a x \cdot \text{Log}_a y$

c. $\text{Log}_a x^2 \neq (\text{Log}_a x)^2$

4. جد قيمة ما يأتي :

a. $\text{Log}_{10} 40/9 + 4 \text{Log}_{10} 5 + 2 \text{Log}_{10} 6$

b. $2 \text{Log}_{10} 8 + \text{Log}_{10} 125 - 3 \text{Log}_{10} 20$

c. $\text{Log}_a (x^2 - 4) - 2 \text{Log}_a (x - 2) + \text{Log}_a (x - 2) / (x + 2)$

5. إذا كان $\text{Log}_{10} 3 = 0.4771$ ، $\text{Log}_{10} 2 = 0.3010$ جد قيمة كل مما يأتي:

a. $\text{Log}_{10} 0.002$

b. $\text{Log}_{10} 2000$

c. $\text{Log}_{10} 12$

6. حل المعادلات الآتية:

- a. $\log_3(2x - 1) + \log_3(x + 4) = \log_3 5$
 b. $\log_2(3x + 5) - \log_2(x - 5) = 3$
 c. $\log_a 6/5 + \log_a 5/66 - \log_a 132/121 + \log_a 12 = x$
 d. $\log_{10}(3x - 7) + \log_{10}(3x + 1) = 1 + \log_{10} 2$

[1-4] اللوغاريتمات العشرية Decimal Logarithms

سبق ان درسنا اللوغاريتم لاي اساس $a \neq 1, a > 0$

والآن سنتعرف على لوغاريتم اساسه $a = 10$ يسمى اللوغاريتم العشري (اللوغاريتم الاعتيادي Common Logarithm) وقد اتفق على عدم كتابة الاساس (10) حين استعماله.

فمثلاً: $\log_{10} 7$ يكتب $\log 7$ ، $\log_{10} 0.06$ يكتب $\log 0.06$

$\log_{10} x$ يكتب $\log x$

ومن المفيد هنا ان نذكر $\log 10^n = n$ فمثلاً: $\log 10^5 = 5$ ، $\log 10^{-2} = -2$ ، $\log 0.01 = \log 10^{-2} = -2$

[1-5] اللوغاريتمات الطبيعية Natural Logarithm

تعرفت في بند [1-4] على اللوغاريتمات العشرية حيث كان الاساس (10) والان سنتعرف على اللوغاريتمات التي اساسها ((e))

حيث $e = 2.718281828459045$ ويمكن ايجاده () حيث $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$

وبالتقريب تكون $e = 2.71828$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \Rightarrow$$

بشكل :

X	$(1+x)^{\frac{1}{x}}$
0.1	2.59374264
0.01	2.70481383
0.001	2.71692393
0.0001	2.71814593
0.00001	2.71826824
0.000001	2.71828047
0.0000001	2.71828169
0.00000001	2.71828181

وإذا فرضنا $n = \frac{1}{x}$ فإن $n \rightarrow \infty$ إذا كانت $x \rightarrow 0^+$

ويصبح القانون $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

والتي تسمى باللوغاريتمات الطبيعية وتكتب بالشكل ((Ln)) لتمييزها عن اللوغاريتم العشري ((Log))

من تعريف (الدالة اللوغاريتمية) لو بدلنا الاساس a بالاساس e نحصل على

$$x = \text{Ln } y \Leftrightarrow y = e^x$$

ملاحظة:

قواعد اللوغاريتمات الطبيعية نفس قواعد اللوغاريتمات العشرية

نتيجة (1):

$$\text{Ln } e^x = x, \forall x \in \mathbb{R}$$

البرهان: الطرف الايسر

$$\text{Ln } e^x = x \text{ Ln } e$$

$$= (x)(1)$$

$$= x \quad \text{الطرف الايمن}$$

نتيجة (2):

قاعدة تبديل الاساس .

$$a > 0, a \neq 1$$

$$\text{Log}_a x = \frac{\text{Ln } x}{\text{Ln } a}, \text{Log}_a x = \frac{\text{Log } x}{\text{Log } a}$$

البرهان: الطرف الايسر .

$$\text{نفرض } y = \text{Log}_a x \Rightarrow x = a^y \quad \dots\dots\dots (1)$$

بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفي العلاقة 1

$$\text{Ln } x = \text{Ln } a^y$$

$$\text{Ln } x = y \text{ Ln } a \Rightarrow y = \text{Ln } x / \text{Ln } a = \text{الطرف الايمن}$$

مثال

$$1 / \text{Log}_3 15 + 1 / \text{Log}_5 15 \quad \text{ما قيمة}$$

الحل:

$$\begin{aligned} 1 / (\text{Ln } 15 / \text{Ln } 3) + 1 / (\text{Ln } 15 / \text{Ln } 5) &= (\text{Ln } 3 / \text{Ln } 15) + (\text{Ln } 5 / \text{Ln } 15) \\ &= (\text{Ln } 3 + \text{Ln } 5) / \text{Ln } 15 = \text{Ln } 15 / \text{Ln } 15 = 1 \end{aligned}$$

[1-6] استخدام الآلة الحاسبة

بعد دراستنا للوغاريتمات العشرية والطبيعية وبعض قوانين اللوغاريتمات. الان سندرس كيفية استخدام الحاسبة (Calculator) لإيجاد لوغاريتم عدد ولوغاريتمات الاعداد المقابلة.

أولاً: إيجاد لوغاريتم العدد :

(أ) في حالة اللوغاريتمات العشرية (Log)

* نكتب العدد المعطى ثم نضغط على المفتاح Log فيظهر الناتج .



مثال 1

استخدم آلك الحاسبة لتجد:

1. Log 7 2. Log 13 3. Log 0.08 4. Log 1.5

الحل :

1. نكتب 7 ثم نضغط Log الناتج = 0.84509804

اي $\text{Log}7 = 0.84509804$

2. نكتب 13 نضغط Log الناتج = 1.113941352

3. نكتب 0.08 نضغط Log الناتج = - 1.096910013

4. نكتب 1.5 نضغط Log الناتج = 0.176091259

(ب) في حالة اللوغاريتمات الطبيعية ((Ln))

* نكتب العدد نضغط المفتاح Ln فيظهر الناتج

مثال 2

استخدم آلك الحاسبة لتجد:

1. Ln 7 2. Ln 13 3. Ln 0.08 4. Ln 1.5

الحل :

1. نكتب 7 نضغط Ln الناتج = 1.945910149

2. نكتب 13 نضغط Ln الناتج = 2.564949357

3. نكتب 0.08 نضغط Ln الناتج = - 2.525728644

4. نكتب 1.5 نضغط Ln الناتج = 0.405465108

ثانياً: أيجاد العدد المقابل اذا علم لوغاريتمه

(أ) في حالة اللوغاريتمات العشرية

* نكتب لوغاريتم العدد المعطى نضغط على مفتاح 2ndF (او في بعض الحاسبات INV) ويكون لونه عادةً ((اصفر، ازرق ...)) ثم نضغط على Log فيظهر العدد المطلوب .

مثال 3

باستخدام آلتك الحاسبة جد الاعداد المقابلة التي لوغاريتماتها العشرية هي:

1. 0.84509804 2. 1.113943352 3. - 1.096910013 4. 0.176091259

الحل:

1. نكتب 0.84509804 نضغط 2ndF ثم نضغط Log فيظهر 7
2. نكتب 1.113943352 نضغط 2ndF نضغط Log يظهر 12.9999999 ≈ 13
3. نضغط مفتاح $\boxed{-}$ نكتب 0.096910013 ثم نضغط $\boxed{=}$
- فيظهر -0.096910013 ثم نضغط 2ndF ثم Log يظهر 0.08
4. نكتب 0.176091259 نضغط 2ndF ثم Log يظهر 1.5

ملاحظة:

قارن نتائج مثال (1) مع مثال (3)

(ب) في حالة اللوغاريتمات الطبيعية ((Ln))

* نكتب لوغاريتم العدد المعطى ثم نضغط على مفتاح 2ndF ثم نضغط Ln فيظهر العدد المطلوب

مثال 4

جد الاعداد المقابلة للاعداد التي لوغاريتمها الطبيعي هي:

1. 1.945910149 2. 2.564949357
3. -2.525728644 4. 0.405465108

الحل:

1. نكتب 1.945910149 نضغط 2ndF ثم Ln فيظهر 7
2. نكتب 2.564949357 ثم نضغط 2ndF ثم Ln يظهر 12.999999999 ≈ 13
3. نضغط $\boxed{-}$ نكتب 2.525728644 ثم $\boxed{=}$ فيظهر -2.525728644
- نضغط 2ndF ثم Ln فيظهر 0.08
4. نكتب 0.405465108 نضغط 2ndF ثم Ln فيظهر 1.5

أمثلة متنوعة (استخدم آلتك الحاسبة)

مثال 1

جد قيمة $\text{Log}_4 3$

الحل :

باستخدام قاعدة تبديل الأساس

$$\text{Log}_4 3 = \text{Log} 3 / \text{Log} 4 = 0.4771 / 0.6021 = 0.7924$$

مثال 2

جد قيمة $\text{Log} 7 + \text{Ln} 5$

الحل :

$$\text{Log} 7 = 0.8451 \quad \text{نجد}$$

$$\text{Ln} 5 = 1.6094$$

$$\begin{aligned} \text{Log} 7 + \text{Ln} 5 &\simeq 0.8451 + 1.6094 \\ &= 2.4545 \end{aligned}$$

مثال 3

جد قيمة $\text{Log}_5 16 - \text{Log}_5 2$

الحل :

$$\begin{aligned} \text{Log}_5 16 - \text{Log}_5 2 &= \text{Log}_5 16/2 \\ &= \text{Log}_5 8 \quad \text{بتبديل الاساس} \\ &= \text{Log} 8 / \text{Log} 5 \simeq 0.9031 / 0.6999 \\ &\simeq 1.2903 \end{aligned}$$

مثال 4

جد قيمة $x = (1.05)^{15}$ باستخدام اللوغاريتم

الحل :

$$x = (1.05)^{15} \quad \text{نأخذ لوغاريتم الطرفين}$$

$$\text{Log} x = 15 \text{ Log} 1.05 \quad \text{باستخدام آلتك الحاسبة}$$

$$\text{Log} x = 15 \times 0.0212$$

$$\text{Log} x = 0.3180$$

$$\therefore x = 2.0797$$

مثال 5

في سنة 1995 حدثت هزة أرضية في إحدى مدن العالم بدرجة 8.0 والمصنف على مقياس ريختر ، وحدثت هزة أخرى في 2001 في مدينة أخرى بمقدار 6.8 قارن بين الطاقة المنطلقة من هاتين الهزتين .

الحل:

$$R = \frac{E \cdot 30^{8.0}}{E \cdot 30^{6.8}} = \frac{30^{8.0}}{30^{6.8}}$$

$$R = 30^{8.0-6.8}$$

$$R = 30^{1.2}$$

$$\text{Log } R = 1.2 \text{ Log } 30$$

وباستخدام الحاسبة اليدوية نجد

$$R = 59.2$$

مثال 6

جد الوسط الهندسي للأعداد: 13 ، 14 ، 15 ، 16

الحل :

$$\sqrt[n]{(x_1)(x_2)(x_3) \dots (x_n)} = \text{الوسط الهندسي}$$

$$M = \sqrt[4]{(13)(14)(15)(16)}$$

$$\text{Log } M = \frac{1}{4} [\text{Log } 13 + \text{Log } 14 + \text{Log } 15 + \text{Log } 16]$$

$$\text{Log } M = \frac{1}{4} [1.1139 + 1.1462 + 1.1761 + 1.2041]$$

$$= \frac{1}{4} \times 4.6403$$

$$= 1.1601$$

$$\therefore M = 14.458$$

مثال 7

أوجد الرقم الهيدروجيني لماء البحر إذا كان تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ له حوالي:

$$3.2 \times 10^{-9}$$

الحل :

$$\text{PH} = -\text{Log } [H^+] \quad \text{الرقم الهيدروجيني}$$

$$= -\text{Log } 3.2 \times 10^{-9}$$

$$\begin{aligned}
&= -[\text{Log } 3.2 + \text{Log } 10^{-9}] \\
&= -[\text{Log } 3.2 - 9\text{Log } 10] \\
&= -[\text{Log } 3.2 - 9] \\
&= -\text{Log } 3.2 + 9 \\
&= -0.5052 + 9 \\
&= 8.494
\end{aligned}$$

مثال 8

بفرض أنك تستثمر (2) مليون دينار بفائدة مركبة سنوية مستمرة قدرها 2% اوجد جملة ما ستحصل عليه بعد (10) سنوات.

الحل:

قانون حساب الفائدة المركبة المستمرة هو $R = m e^{n \cdot r}$

حيث $m =$ المبلغ ، $r =$ الفائدة ، $n =$ عدد السنوات

$$R = 2.000.000 \times e^{\frac{2}{100} \times 10}$$

بأخذ Ln الطرفين $R = 2.000.000 \times e^{1/5}$

$$\text{Ln } R = \text{Ln } 2.000.000 + 1/5$$

$$= 14.7087$$

$$\therefore R = 2442908$$

مثال 9

استخدم صاروخ لدفع سفينة فضائية. فإذا كانت نسبة كتلته 20 وسرعة انطلاق البخار 1.5 كم/ثا وزمن الاشتعال 100 ثا. جد سرعة الصاروخ .

الحل:

استخدم العلاقة $s = -0.0098 n + v \text{Ln } k$

حيث: $s =$ سرعة الصاروخ ، $n =$ الزمن ، $v =$ سرعة انطلاق البخار ، $k =$ نسبة كتلته

$$s = -0.0098 \times 100 + 1.5 \text{Ln } 20$$

$$s = -0.98 + 1.5 \times (2.9956)$$

$$= -0.98 + 4.4934$$

$$\therefore s = 3.5134 \text{ كم/ثا}$$

تمارين (1-2)

« استخدم آلتك الحاسبة »

1. جد قيمة كل من:

a. $\text{Log}_{10} 8$ b. $\text{Log}_3 15$ c. $\text{Ln } 200$

2. جد قيمة كل مما يأتي:

a. $\text{Log}_2 52 - \text{Log } 27$ b. $\text{Log } 33 + \text{Log}_8 33 + \text{Ln } 33$

3. جد قيمة كل مما يأتي:

a. $\sqrt[3]{(65.26)^2}$ b. $(1.02)^{10}$

4. حل كلا من المعادلات الآتية:

a. $3^x = 26$ b. $e^{3x+1} = 17$ c. $(2^x) = 4^{1-x}$

5. جد الوسط الهندسي للأعداد الآتية:

10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15

6. أثبت ان:

a. $1/\text{Log}_a abc + 1/\text{Log}_b abc + 1/\text{Log}_c abc = 1$

b. $\text{Log } 40/9 + 2 (2\text{Log } 5 + \text{Log } 6) = 5$

7. اذا كان

$\text{Log } a = 1/ab$ فإن $a = \text{Log } b$ ، $b = \text{Log } c$

8. تركيز ايون الهيدروجين $[H^+]$ في اللبن هو 2.5×10^{-7} فجد الرقم الهيدروجيني له.

9. باستخدام قانون الفائدة المركبة $R = me^{n \cdot r}$ لاستثمار مليون دينار بفائدة قدرها 2.5% ولمدة

(6) سنوات. جد جملة ما سيحصل عليه.

10. جد سرعة صاروخ نسبة كتلته نحو 10، وسرعة انطلاق بخاره قدرها 3.5 كم/ثا، وزمن

اشتعال المحرك 50 ثانية.

11. اي مقدار (مقادير) يكافئ المقدار $2\text{Log } a - \text{Log } b$ ؟

1. $\text{Log } (a/b)^2$ 2. $\text{Log } a^2/b$ 3. $\text{Log } (ab)^2$ 4. $\text{Log } a^2 - \text{Log } b$

12. في سنة 1997 حدثت هزة أرضية في إحدى المدن العالمية بدرجة 4.9 والمصنف على مقياس ريختر ، وحدثت هزة أخرى في مدينة أخرى سنة 1999 بمقدار 7.0 ، قارن بين الطاقة المنطلقة من هاتين الهزتين.

13. اختر الإجابة الصحيحة للمقدار $\text{Log } a/b$

1. $\text{Log } a / \text{Log } b$ 2. $\text{Log } a - \text{Log } b$ 3. $\text{Log } (a-b)$ 4. ليس أي منها

Sequences المتتابعات

- [2-1] المتتابعة كدالة وتعريف .
- [2-2] الحد العام للمتتابعة .
- [2-3] المتتابعة الحسابية .
- [2-3-1] مجموع المتتابعة الحسابية .
- [2-4] المتتابعة الهندسية .
- [2-4-1] الحد العام للمتتابعة الهندسية .
- [2-4-2] المتتابعة الهندسية اللانهائية .

المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
الحد الأول	a
المتتابعة الحسابية	$d = U_{n+1} - U_n$
أساس	
المتتابعة الهندسية	$r = \frac{U_{n+1}}{U_n}$
المتتابعة الحسابية	$U_n = a + (n-1) d$
الحد العام	
المتتابعة الهندسية	$U_n = a r^{n-1}$
المتتابعة الحسابية	$S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1) d]$
مجموع	
المتتابعة الهندسية	$S_n = \frac{a (1 - r^n)}{1 - r}$
المتتابعة الهندسية اللانهائية	$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$

الفصل الثاني

المتتابعات Sequences

[2-1] المتتابعة كدالة وتعريف

قبل تعريف المتتابعة نأخذ المثال الآتي :

مثال

$$f: \{1, 2, 3, \dots, 10\} \rightarrow \mathbb{R}$$

ليكن

$$f(n) = 5 + 2n$$

إن هذه الدالة تعين لكل عدد صحيح موجب (n) من بين عناصر المجموعة الجزئية من \mathbb{Z}^+ الصورة ($5+2n$) وإن:

$$f(1) = 5 + 2 = 7, \quad f(2) = 5 + 4 = 9, \quad f(3) = 5 + 6 = 11$$

$$f(10) = 5 + 20 = 25$$

ويمكن أن نعبر عن هذه الدالة على صورة أزواج مرتبة كالتالي :

$$\{(1,7), (2,9), (3,11), \dots, (10,25)\}$$

ولأن مجال الدالة هو المجموعة $\{1,2,3,\dots,10\}$ فإنه يمكن كتابة مداها مرتباً على الصورة

$$\{7,9,11, \dots, 25\}$$

$$7 = (1) \text{ أي صورة}$$

$$9 = (2) \text{ صورة وهكذا}$$

وهذه الدالة تسمى [متتابعة] والاعداد المتتابعة تسمى بـ [حدود المتتابعة]

المتتابعة هي دالة مجالها \mathbb{Z}^+ (في هذه الحالة تسمى متتابعة غير منتهية Infinite Sequence)

أو أي مجموعة جزئية مرتبة ومنتهية تنتمي إلى \mathbb{Z}^+ تبدأ بالعدد (1) أي على الصورة

$$\{1,2,3,\dots, n\} \text{ (في هذه الحالة تسمى متتابعة منتهية) وتكتب بشكل } \langle \dots, \dots, \dots, \dots \rangle$$

$$f = \{(1,3), (2,7), (5,4), (6,10), (7,9)\}$$

لا تسمى متتابعة لأن مجالها $\{1,2,5,6,7\}$

$$\{1,2,3,4,5,6\}$$

أي أن مجالها ليس مجموعة جزئية مرتبة ومتتابعة من \mathbb{Z}^+ تبدأ بالرقم 1.

مثال 1

لتكن $n \in \mathbb{Z}^+$ حيث $f(n) = 1/n$ أكتب المتتابعة .

الحل :

$$f(1) = 1 , f(2) = 1/2 , f(3) = 1/3 , \dots$$

وتكتب بالشكل الآتي : المتتابعة $\langle 1 , 1/2 , 1/3 , \dots \rangle$

مثال 2

لتكن $n \in \{1,2,3,\dots,20\}$ $f(n) = n^2 + 1$ أكتب المتتابعة .

الحل :

$$f(1) = 2 , f(2) = 5 , f(3) = 10 , \dots , f(20) = 401$$

\therefore المتتابعة $\langle 2 , 5 , 10 , \dots , 401 \rangle$

مثال 3

لتكن $f(n) = n , n \in \mathbb{R}$ ، هل تمثل متتابعة ؟

الحل :

ليست متتابعة لأن مجالها ليس \mathbb{Z}^+ أو مجموعة مرتبة منها على صورة $\{1,2,3,\dots,n\}$

ملاحظة :

إذا لم يحدد مجال المتتابعة نعتبره \mathbb{Z}^+

مثال 4

اكتب الحدود الستة الأولى للمتتابعة:

$$f(n) = \begin{cases} 4 - n & \text{فردى } n \\ n^2 & \text{زوجى } n \end{cases}$$

الحل :

n زوجى (even)

$$f(2) = 2^2 = 4$$

$$f(4) = 4^2 = 16$$

$$f(6) = 6^2 = 36$$

n فردى (odd)

$$f(1) = 4 - 1 = 3$$

$$f(3) = 4 - 3 = 1$$

$$f(5) = 4 - 5 = -1$$

وتكون الحدود الستة الأولى على الترتيب هي : $\langle 3 , 4 , 1 , 16 , -1 , 36 \rangle$

[2-2] الحد العام للمتتابعة: General Term For Sequence

الحد العام أو (الحد النوني) هو قاعدة عامة يمكن منها إيجاد كل حدود المتتابعة.

فمثلاً متتابعة الاعداد الزوجية الموجبة: ... 2, 4, 6, 8 حدها العام هو:

$$f(n) = 2n, n \in \mathbb{Z}^+$$

نرمز للحد العام بالرمز U_n فيكون: $U_n = f(n)$

بمعنى: $U_1 = f(1), U_2 = f(2)$

وهكذا، وسنستخدم الرمز U_n لتعني المتتابعة التي حدها العام U_n وتكتب

$$U_1, U_2, \dots, U_n, \dots$$

وكذلك متتابعة الاعداد الفردية الموجبة: ... 1, 3, 5, 7 حدها العام هو:

$$U_n = 2n - 1, n \in \mathbb{Z}^+$$

مثال 1

اكتب خمسة حدود الأولى من المتتابعة التي حدها العام هو $\frac{(-1)^n}{n}$

الحل :

$$U_1 = (-1)^1/1 = -1, U_2 = (-1)^2/2 = 1/2, U_3 = (-1)^3/3 = -1/3$$

$$U_4 = (-1)^4/4 = 1/4, U_5 = (-1)^5/5 = -1/5$$

∴ المتتابعة $\langle -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5 \rangle$

مثال 2

اكتب الحدود الستة الأولى للمتتابعة التي حدها العام

$$U_n = \begin{cases} 2 & \text{فردى } n \\ -n/4 & \text{زوجى } n \end{cases}$$

الحل :

$$U_1 = 2, U_2 = -1/2, U_3 = 2, U_4 = -1, U_5 = 2, U_6 = -3/2$$

∴ المتتابعة $\langle 2, -1/2, 2, -1, 2, -3/2 \rangle$

مثال 3

اكتب المتتابعة U_n حيث:

$$U_n = \begin{cases} 1/n^2 & \text{فردى } n \leq 5 \\ n+1 & \text{زوجى } n \leq 6 \end{cases}$$

الحل :

$$U_1 = 1, U_2 = 2+1=3, U_3 = 1/3^2 = 1/9, U_4 = 4+1 = 5$$

$$U_5 = 1/5^2 = 1/25, U_6 = 6+1 = 7$$

\therefore المتتابعة $\langle 1, 3, 1/9, 5, 1/25, 7 \rangle$

مثال 4

اكتب الثلاثة حدود الأولى من المتتابعة التي حدها العام $U_n = 3$

الحل:

$$U_1 = 3, U_2 = 3, U_3 = 3$$

\therefore المتتابعة $\langle 3, 3, 3 \rangle$

ملاحظات:

1. المتتابعة التي حدودها متساوية تسمى [المتتابعة الثابتة]
2. ترتيب الحدود يعد خاصية مميزة للمتتابعة ولذلك فإن المتابعتين:
 $\langle F_n \rangle = \langle 3, 2, 7, 9, 4 \rangle$, $\langle H_n \rangle = \langle 3, 7, 2, 9, 4 \rangle$
مختلفتان لأن: $F_2 = 2$ بينما $H_2 = 7$
 $F_3 = 7$ بينما $H_3 = 2$
3. قد لا تكون لبعض المتتابعات قاعدة لحددها العام فمثلاً :
المتتابعة $\langle 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \dots \rangle$
ليس لحددها العام قاعدة حيث لا يمكن إيجاد صورة عامة يمكن بواسطتها إيجاد كل حدود هذه المتتابعة .

تمارين (2-1)

1. أي العبارات التالية صحيحة وأيها خاطئة:

- كل دالة مجالها Z^+ هي متتابعة.
- كل دالة مداها Z^+ هي متتابعة.
- كل دالة مجالها $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ هي متتابعة.
- كل دالة مجالها Z هي متتابعة.
- كل دالة مجالها $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ متتابعة منتهية.
- كل دالة مجالها $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ هي متتابعة.
- الحد الرابع في المتتابعة $\sqrt{n}/(n+1) <$ يساوي $2/5$
- مجال المتتابعة $\langle 2, 4, 6, \dots, 96 \rangle$ هو Z^+ .
- في المتتابعة $\langle U_n \rangle$ حيث $U_{n+1} = n U_n$ فإن الحدان الأول والثاني مختلفان عندما $n = 1$
- في المتتابعة $\langle n^2 \rangle$ يكون $U_{n+1} < U_n$

2. أكتب كلاً من المتتابعات الآتية مكتفياً بذكر الحدود الستة الأولى:

- $U_n = n^2 - 2n$
- $U_n = 2$
- $U_n = 6/n$
- $U_{n+1} = \frac{4}{1+U_n}, U_1 = 1$
- $U_n = 1 - \frac{2}{n}$
- $U_n = (-1)^n$
- $U_n = 2^{n-1}$
- $U_n = \begin{cases} 1 & \text{فردية } n \\ 2 & \text{زوجية } n \end{cases}$

3. في المتتابعة $\langle U_n \rangle$ حيث $U_n = n^2 + 2n$ أثبت أن $U_{n+1} > U_n$

4. اكتب ثمانية حدود من المتتابعة بفرض:

$$\Rightarrow U : Z^+ \rightarrow R, U_n = \begin{cases} n + 2 & \text{فردية } n \\ \frac{4}{n} & \text{زوجية } n \end{cases}$$

[2-3] المتتابة الحسابية Arithmetic Sequence

هي متتابة يكون فيها ناتج طرح كل حد من الحد الذي يليه مباشرة يساوي عدداً ثابتاً يسمى أساس المتتابة (الفرق المشترك Common Difference) ويرمز له بالحرف $d = U_{n+1} - U_n$ وكذلك فانه يكفي لتعيين المتتابة الحسابية معرفة حدها الاول (First Term a) وأساسها (d) ثم باضافة الاساس الى الحد الاول نحصل على الحد الثاني وهكذا...

فمثلاً المتتابة الحسابية التي فيها $a = 2$ ، $d = 3$ هي:

$$\langle 2 , 5 , 8 , 11 , 14 , 17 , \dots \rangle$$

والمتتابة التي حدها الاول a وأساسها d هي:

$$\langle a , a+d , a+2d , a+3d , \dots \rangle$$

أنواع المتتابعات الحسابية:

أ. $\langle 2 , 4 , 6 , 8 , \dots \rangle$ متتابة متزايدة فيها $d > 0$ ($d=4-2=2$)

ب. $\langle 7 , 3 , -1 , -5 , \dots \rangle$ متتابة متناقصة فيها $d < 0$ ($d=3-7=-4$)

ج. $\langle 3 , 3 , 3 , \dots \rangle$ متتابة ثابتة فيها $d = 0$ ($d=3-3=0$)



الحد العام للمتتابة الحسابية: General Term for Arithmetic Sequence

ذكرنا أن المتتابة الحسابية التي حدها الأول a وأساسها d هي:

$$\langle a , a+d , a+2d , a+3d , \dots \rangle$$

$$\therefore U_1 = a = a + (0) d = a + (1-1) d$$

$$U_2 = a + (1) d = a + (2-1) d$$

$$U_3 = a + (2) d = a + (3-1) d$$

$$U_4 = a + (3) d = a + (4-1) d$$

.

.

.

$$\therefore U_n = a + (n-1) d , \forall n > 0 , n \in \mathbb{N}$$

وبصورة عامة

يسمى بالحد العام أو (الحد النوني) للمتتابة الحسابية.

مثال 1

اكتب المتتابعة الحسابية التي حدها الاول = 7 ، وأساسها = -3 مكتفياً بالحدود الستة الاولى

منها:

$$\begin{array}{ccccccc} & +(-3) & +(-3) & +(-3) & +(-3) & +(-3) & \\ \rightarrow & & \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow & \rightarrow & \\ <7, & 4, & 1, & -2, & -5, & -8, & \dots> \end{array}$$

الحل:

المتتابعة هي: $<7, 4, 1, -2, -5, -8, \dots>$

مثال 2

أوجد الحد العاشر من المتتابعة الحسابية: $<4, 9, 14, \dots>$

الحل:

نستخدم قانون الحد العام:

$$d = 5, a = 4$$

$$\therefore U_n = a + (n-1) d$$

$$U_{10} = 4 + (10-1) \times 5 = 4 + 9 \times 5 = 49$$

مثال 3

اكتب المتتابعة الحسابية التي حدها السابع = 36 وأساسها = 4

الحل:

$$U_7 = a + 6 d$$

$$36 = a + 6 \times 4 \Rightarrow a = 12 \Rightarrow \begin{array}{ccccccc} & +4 & +4 & +4 & & & \\ \rightarrow & & \rightarrow & \rightarrow & & & \\ <12, & 16, & 20, & 24, & \dots> \end{array}$$

\therefore المتتابعة الحسابية هي: $<12, 16, 20, 24, \dots>$

مثال 4

متتابعة حسابية حدها الثالث = 9 وحدها السابع = -3 أوجد حدود المتتابعة بين U_3 , U_7 .

الحل:

$$U_3 = a + 2 d = 9 \quad \dots(1)$$

$$U_7 = a + 6d = -3 \quad \dots(2)$$

$$4d = -12 \Rightarrow d = -3 \quad \text{ب طرح 1 من 2 ينتج:}$$

$$a + 2(-3) = 9 \Rightarrow a = 15 \quad \text{بالتعويض في (1):}$$

$$\therefore U_4 = a + 3 d = 15 + 3(-3) = 6$$

$$U_5 = a + 4 d = 15 + 4(-3) = 3$$

$$U_6 = a + 5 d = 15 + 5(-3) = 0$$

مثال 5

أوجد الحد الذي ترتيبه 200 في المتتابعة الحسابية التي حدها الخامس = (-4)

وأساسها = (12)

الحل:

وحيث أن $d = 12$ نجد a باستخدام قانون الحد العام حيث:

$$U_5 = a + 4d \Rightarrow -4 = a + 4 \times 12 \Rightarrow a = -52$$

$$U_{200} = a + 199d$$

$$\therefore U_{200} = -52 + 199 \times 12 = 2336$$

مثال 6

أوجد عدد حدود المتتابعة الحسابية $\langle -7, -4, -1, \dots, 113 \rangle$

الحل:

$$a = -7, \quad d = -4 - (-7) = 3, \quad U_n = 113$$

$$\therefore U_n = a + (n - 1)d$$

$$113 = -7 + (n - 1) \times 3 \Rightarrow 120 = 3(n - 1) \Rightarrow n = 41 \quad \text{عدد حدود المتتابعة.}$$

الأوساط الحسابية:

إذا كان لدينا العددين a, b وادخلنا بينهما الأعداد c, d, e, \dots

كأوساط حسابية بين a, b حيث عدد الحدود = عدد الأوساط + 2

مثلاً إذا أدخلنا 6 أوساط حسابية بين 38, 10 تتكون متتابعة حسابية عدد حدودها $8 = 2 + 6$

$$U_8 = 38, \quad n = 8, \quad a = 10, \quad d = ? \quad \text{كذلك}$$

$$U_8 = a + 7d \Rightarrow 38 = 10 + 7d \Rightarrow 28 = 7d \Rightarrow d = 4$$

$$10, [14, 18, 22, 26, 30, 34], 38 \quad \therefore \text{الأوساط}$$

Sum of an Arithmetic Sequence: [2-3-1]

إذا كانت (U_n) متتابعة حسابية فإن مجموع n حداً الأولى فيها يرمز له بالرمز S_n أي أن:

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n \quad \text{حيث } U_n \text{ الحد الأخير}$$

$$S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \dots + (U_n - d) + U_n$$

$$\therefore S_n = U_n + (U_n - d) + (U_n - 2d) + \dots + (a+d) + a \quad \text{وبعكس الترتيب}$$

$$\text{بالجمع} \quad 2S_n = (a+U_n) + (a+U_n) + (a+U_n) + \dots + (a+U_n) + (a+U_n)$$

$$2S_n = n(a + U_n)$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [a + U_n]$$

قانون إيجاد مجموع n من حدود المتتالية الحسابية إذا علم الحد الأول والأخير.

عندما نعوض الحد العام = (الحد الأخير U_n) حيث:

$$U_n = a + (n - 1)d$$

\therefore يصبح قانون المجموع بدلالة الحد الأول (a) والاساس (d)

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [a + a + (n - 1)d]$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$$

مثال 1


أوجد مجموع 4 حدود من المتتابعة الحسابية التي حدها الأول = 2 وحدها الرابع = 5

الحل :

$$a = 2, U_4 = 5, n = 4, S_4 = ?$$

$$S_n = \frac{n}{2} [a + U_n]$$

$$S_4 = \frac{4}{2} [2+5] = 14$$



مثال 2

أوجد مجموع حدود المتتابعة الحسابية $<1, 2, 3, \dots, 100>$

الحل :

$$a = 1, U_n = 100, n = 100$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [a + U_n] = \frac{100}{2} [1+100] = 50 \times 101 = 5050$$

مثال 3

متتابعة حسابية حدها الثاني = 4 وحدها ما قبل الاخير = 22 وعدد حدودها = 12 جد مجموعها.

الحل: في أية متتابعة حسابية يكون :

الحد الاول + الحد الاخير = الحد الثاني + الحد ما قبل الاخير

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [a + U_n] = \frac{12}{2} [4 + 22] = 6 \times 26 = 156$$

مثال 4

جد مجموع ثمان حدود من المتتابعة الحسابية $\langle -4, 1, 6, \dots \rangle$

الحل:

$$a = -4, \quad d = 5, \quad n = 8$$

$$\therefore S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1) d]$$

$$S_8 = \frac{8}{2} [2 \times (-4) + (8-1) \times 5]$$

$$S_8 = 4 [-8 + 35] = 4 \times 27 = 108$$

مثال 5

ثلاث اعداد تكون متتابعة حسابية مجموعها = 15 ومجموع مربعاتها = 83 فما هي الاعداد؟

الحل:

نفرض الاعداد الثلاثة: $a - d, a, a + d$

$$3a = 15 \quad \therefore \text{مجموع الاعداد:}$$

$$\therefore a = 5$$

$$\therefore \text{الاعداد } 5-d, 5, 5+d$$

$$(5-d)^2 + 25 + (5+d)^2 = 83$$

$$25 - 10d + d^2 + 25 + 25 + 10d + d^2 = 83$$

$$2d^2 + 75 = 83 \Rightarrow 2d^2 = 8 \Rightarrow d^2 = 4$$


$$\therefore d = \pm 2$$

عندما $d = 2$ \therefore الاعداد : 3 , 5 , 7 (تصاعدية لان $d > 0$)

عندما $d = -2$ \therefore الاعداد : 7 , 5 , 3 (تنازلية لان $d < 0$)

خواص المتتابعة الحسابية :

- 1 إذا أضيفت كمية ثابتة الى كل حد من حدود المتتابعة الحسابية، أو طرحت كمية ثابتة من حدود المتتابعة الحسابية، كانت الكميات الناتجة مكونة متتابعة حسابية ايضاً أساسها أساس المتتابعة الأصلية .
- 2 إذا ضرب كل حد من حدود متتابعة حسابية في مقدار ثابت أو قسم على مقدار ثابت كونت الكميات الناتجة متتابعة حسابية ايضاً بأساس يختلف عن المتتابعة الأصلية.
- 3 حاصل جمع أو طرح متابعتين حسابيتين يكون متتابعة حسابية أساسها هو المجموع أو الفرق بين أساسي المتابعتين.



تمارين (2-2)

- 1 لكل فقرة أربع أجابات واحدة منها فقط صحيحة، إختار الاجابة الصحيحة:

أولاً: المتتابعة $\langle 2n+1 \rangle$

أ. أساسها = 2 وحدها العاشر = 13

ب. أساسها = 1 وحدها العاشر = 21

ج. أساسها = 2 وحدها العاشر = 21

د. أساسها = 2 وحدها العاشر = 19

ثانياً: إذا كان $\langle -1, 2, x, 8 \rangle$ متتابعة حسابية فإن $x = \dots$

أ. -3 ب. 3 ج. 5 د. 11

ثالثاً: إذا كان $\langle -3, x, 11 \rangle$ متتابعة حسابية فإن $x = \dots$

أ. 7 ب. 4 ج. 8 د. 14

رابعاً: في المتتابعة الحسابية $\langle 3, 7, 11, \dots, x, 63 \rangle$ $x = \dots$

أ. 15 ب. 33 ج. 59 د. ليس أي مما سبق

- 2 اكتب الحدود الخمسة الاولى لكل من المتتابعات الحسابية التي فيها:

أولاً: $a = -5$, $d = 3$

ثانياً: $a = -20$, $d = -4$

ثالثاً: $a = -3$, $U_{n+1} = U_n + 4$


رابعاً: $U_n = (5n - 9)$

3. جد الحد السابع عشر من المتتابة الحسابية $\langle -15, -12, -9, \dots \rangle$
4. جد عدد حدود المتتابة الحسابية $\langle 55, \dots, -14, -17, -20 \rangle$ ثم جد مجموعها .
5. $\langle \dots, 2x^2+x+3, 2x^2+1, x^2+1 \rangle$ متتابة حسابية.
جد قيمة X ؟ وما حدها السابع؟
6. إذا أدخلنا ستة أوساط حسابية بين 2 ، 30 فما هذه الاوساط؟
7. جد المتتابة الحسابية التي حدها الخامس = 8 وحدها الثامن عشر = -31
8. أي حد في المتتابة الحسابية $\langle \dots, -1, -5, -9 \rangle$ يكون مساوياً 87 ، هل يوجد حد في هذه المتتابة = 333؟
9. متتابة حسابية حدها الرابع = -1 وحاصل ضرب حديها الثاني والثالث = 10 فما حدها العاشر؟
10. إذا كانت : $\langle A, 7, \dots, B, 25 \rangle$ متتابة حسابية وكانت $B = 5A + 2$ فما قيمة A, B ؟ وما عدد حدود المتتابة؟
11. أثبت أن مجموع n حداً الاولى من الاعداد الفردية الموجبة $\langle \dots, (2n-1), \dots, 5, 3, 1 \rangle$ هو n^2
12. كم حداً يؤخذ من المتتابة الحسابية $\langle \dots, 17, 21, 25 \rangle$ ابتداءً من حدها الاول ليكون مجموعها = -14 ؟
13. جد مجموع الاعداد الصحيحة المحصورة بين 400 ، 100 وتقبل القسمة على 3.

[2 - 4] المتتابعة الهندسية: Geometric Sequence

وهي متتابعة ليس فيها حد يساوي الصفر، وناتج قسمة كل حد فيها على الحد السابق له مباشرة يساوي عدداً حقيقياً ثابتاً وهذا العدد يسمى أساس المتتابعة الهندسية

(النسبة المشتركة Common Ratio) ويرمز له بالرمز $r = U_{n+1}/U_n$ حيث $r \in \mathbb{R}$



مثال

بين نوع المتتابعات:

أ. $\langle \dots, 11, 7, 5, 3, 2 \rangle$ لا تمثل متتابعة حسابية ولا هندسية

ب. $\langle \dots, 8, 4, 2, 1 \rangle$ متتابعة هندسية لأن:

$$r = 2/1 = 4/2 = 8/4 = 2$$

ج. $\langle \dots, -3, 9, -27, 81 \rangle$ متتابعة هندسية أساسها $-1/3$

د. $\langle \dots, 4, 4, 4, 4 \rangle$ متتابعة ثابتة هي حسابية أساسها 0 وهندسية أساسها 1

هـ. $\langle \dots, 7, 11, 15, 19 \rangle$ متتابعة حسابية أساسها 4

ملاحظات:

متتابعة هندسية تنازلية	$r < 1$	←	إذا كان (a) موجب وإن
متتابعة هندسية ثابتة	$r = 1$		
متتابعة هندسية تصاعدية	$r > 1$		
(سالب) متتابعة هندسية الاشارات فيها تأخذ حالة التناوب الاول موجب والثاني سالب وهكذا	$r < 1$		

متتابعة هندسية تصاعدية	$r < 1$	←	إذا كان (a) سالب وإن
هندسية ثابتة	$r = 1$		
هندسية تنازلية	$r > 1$		
(سالب) هندسية اشارات الحدود فيها تأخذ حالة التناوب الاول سالب والثاني موجب وهكذا	$r < 1$		

فمثلاً:

- هندسية تنازلية $\langle 4, 2, 1, 1/2, \dots \rangle$ $r=1/2, a=4$
 هندسية ثابتة $\langle 4, 4, 4, 4, \dots \rangle$ $r=1, a=4$
 هندسية تصاعدية $\langle 4, 8, 16, 32, \dots \rangle$ $r=2, a=4$
 هندسية متناوبة الاشارة $\langle 4, -2, 1, -1/2, \dots \rangle$ $r=-1/2, a=4$

ثم

- هندسية تصاعدية $\langle -4, -2, -1, -1/2, \dots \rangle$ $r=1/2, a=-4$
 هندسية ثابتة $\langle -4, -4, -4, -4, \dots \rangle$ $r=1, a=-4$
 هندسية تنازلية $\langle -4, -8, -16, \dots \rangle$ $r=2, a=-4$
 هندسية متناوبة الاشارة $\langle -4, 2, -1, 1/2, \dots \rangle$ $r=-1/2, a=-4$

[2-4-1] الحد العام للمتتابعة الهندسية General Term For Geometric Sequence

المتتابعة الهندسية التي حدها الاول a وأساسها r هي:

$$\langle a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots \rangle$$

ويكون:

$$U_1 = a = ar^0 = ar^{(1-1)}$$

$$U_2 = ar^1 = ar^{(2-1)}$$

$$U_3 = ar^2 = ar^{(3-1)}$$

$$U_4 = ar^3 = ar^{(4-1)}$$

.

.

$$U_n = ar^{n-1}$$

قانون الحد العام للمتتابعة الهندسية

مثال 1

اكتب الحدود الستة الاولى من المتتابعة الهندسية التي حدها الاول 64 وأساسها $-1/2$

$$\langle 64, \overset{\times(-\frac{1}{2})}{-32}, \overset{\times(-\frac{1}{2})}{16}, \dots \rangle$$

الحل:

المتتابعة الهندسية هي $\langle 64, -32, 16, -8, 4, -2 \rangle$

مثال 2

جد الحد السابع من متتابعة هندسية حدها الاول = $-1/4$ وأساسها = 2.

الحل:

$$U_n = ar^{n-1}$$

$$\therefore U_7 = (-1/4) (2^{7-1}) = -\frac{1}{4} \times 2^6 = -\frac{1}{4} \times 64 = -16$$

مثال 3

متتابعة هندسية حدها الاول = 3 وحدها الخامس = 48 جد حدها الثامن .

الحل :

$$U_1 = 3 \Rightarrow a = 3$$

$$U_5 = ar^4 \Rightarrow 48 = 3 r^4$$

$$\therefore r^4 = 16 \Rightarrow r = \pm 2$$

عندما $r = 2$

$$U_8 = ar^7 = 3 \times (2)^7 = 3 \times 128 = 384$$

عندما $r = -2$

$$U_8 = ar^7 = 3 (-2)^7 = 3 \times (-128) = -384$$

مثال 4

مجموع الحدود الثلاثة الاولى من متتابعة هندسية حدودها موجبة = 7 وحدها الثالث = 1 فما

حدها السادس؟

الحل:

$$U_1 + U_2 + U_3 = 7$$

$$a + ar + ar^2 = 7$$

$$\therefore a (1 + r + r^2) = 7 \dots\dots(1)$$

$$U_3 = 1 \Rightarrow ar^2 = 1$$

$$\therefore a = 1/r^2 \dots\dots(2)$$

$$\frac{1}{r^2} (1 + r + r^2) = 7 \quad \text{بتعويض 2 في 1 :}$$

$$\therefore 1 + r + r^2 = 7 r^2 \Rightarrow 6r^2 - r - 1 = 0$$

$$(3r+1) (2r-1) = 0$$

إما $r = -1/3$ يهمل لأن حدود المتتابعة موجبة.

$$\therefore a = 1/(1/2)^2 = 4 \quad \text{أو} \quad r = 1/2$$

$$U_6 = ar^5 = 4 (1/2)^5 = 4 \times 1/32 = 1/8$$

الأوساط الهندسية :

إذا كان لدينا العددين a, f وأدخلنا بينهما الأعداد المرتبة b, c, d, \dots, e بحيث $\langle a, b, c, d, \dots, e, f \rangle$ تكون متتابعة هندسية فإن الأعداد b, c, d, \dots, e تسمى أوساط هندسية بين a, f ويكون عدد حدود المتتابعة الهندسية الناتجة = (عدد الأوساط + 2)

مثال

أدخل أربعة أوساط هندسية بين العددين 4 ، 128

$$a = 128, \quad n = 6, \quad U_6 = 4$$

$$\therefore U_6 = ar^5 \Rightarrow 4 = 128r^5 \Rightarrow r^5 = 1/32 = (1/2)^5$$

$$\therefore r = 1/2$$

\therefore الأوساط الهندسية : 64, 32, 16, 8

والمتتابعة الهندسية هي $\langle 128, 64, 32, 16, 8, 4 \rangle$

مجموع المتتابعة الهندسية Sum of a Geometric Sequence

أوضحنا في البند السابق أن المتتابعة الهندسية التي حدها الأول a وأساسها r هي :

$\langle a, ar, ar^2, ar^3, \dots \rangle$ فإذا اخترنا (n) حداً الأولى من المتتابعة فتكون الحدود المختارة هي :

$$\langle a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1} \rangle$$

ومجموع هذه الحدود والذي يرمز له بالرمز S_n هو :

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} \quad \dots (1)$$

بضرب طرفي (1) في r ينتج :

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n \quad \dots (2)$$

بطرح (2) من (1) :

$$S_n - rS_n = a - ar^n$$

$$S_n(1-r) = a(1-r^n)$$

$$\therefore S_n = a(1-r^n)/(1-r) \quad \dots r \neq 1$$

قانون المجموع .

ملاحظة :

إذا كانت $r=1$ فإن المتتابعة الهندسية تصبح $\langle a, a, a, \dots \rangle$ ويكون المجموع الى (n) من

$$S_n = a + a + a + \dots \quad \text{الحدود}$$

$$\therefore S_n = na$$

مثال 1

جد مجموع الستة حدود الاولى من المتتابعة الهندسية $< 64 , 32 , 16 , >$

الحل :

$$a = 64 , \quad n = 6 , \quad r = 1/2$$

$$\therefore S_n = a(1-r^n)/(1-r) \Rightarrow S_6 = 64[1 - (1/2)^6]/(1 - 1/2) = 64[1 - 1/64]/1/2$$

$$S_6 = (64-1) / 1/2 = 2 \times 63 = 126$$

[2-4-2] المتتابعة الهندسية اللانهائية: Infinite Geometric Sequence

إن التعريف الذي أعطي لمجموع حدود المتتابعة يصلح لكل المتتابعات المنتهية وغير المنتهية على حد سواء . وفي حالة المتتابعات الحسابية غير المنتهية فإننا لا نستطيع إيجاد المجموع لحدودها كافة لأن المجموع يكون إما كبير جداً أو صغير جداً فمثلاً أننا لا نستطيع إيجاد :

$$1+5+9+13+17+ \dots$$

$$-1-2-3-4-5- \dots \quad \text{أو}$$

أما بالنسبة للمتتابعة الهندسية غير المنتهية (اللانهائية) فإن الامر مختلف كلياً :

$$S_n = a(1-r^n)/(1-r) = a/(1-r) - ar^n/(1-r)$$


$$\text{وعندما } -1 < r < 1$$

فإن (r^n) تقترب من الصفر كلما زادت n زيادة كبيرة غير محددة لذلك فإن $ar^n/(1-r)$ يقترب من الصفر .

فيكون قانون مجموع المتتابعة الهندسية اللانهائية $\therefore S_\infty = a/(1-r)$

يصلح هذا القانون فقط عندما $-1 < r < 1$

ولا يصلح هذا القانون عندما $r \geq 1$ أو $r \leq -1$



مثال 2

$$\text{جد } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

الحل

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = 1$$

مثال 3

جد مجموع

$$0.4 + 0.04 + 0.004 + \dots$$

الحل :

$$a = 0.4, \quad r = 0.04/0.4 = 0.1$$

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{0.4}{1-0.1} = \frac{0.4}{0.9} = \frac{4}{9}$$

مثال 4


جد ناتج

$$64 - 16 + 4 - 1 + \dots$$

الحل :

$$a = 64, \quad r = -1/4$$

$$S_{\infty} = a/(1-r) = 64/(1 + 1/4) = 4 \times 64/5 = 256/5$$



تمارين (2 - 3)

1. أي العبارات الآتية صحيحة وأيها خاطئة:

- أ. إذا كان r أساس المتتابعة الهندسية $\langle U_n \rangle$ فإن $U_5 = r^2 U_3$
- ب. أساس المتتابعة الهندسية $\langle \dots, -1, 1, -1, 1, \dots \rangle$ هو (1)
- ج. إذا كانت $\langle \dots, -1/2, 2, b, 32, \dots \rangle$ متتابعة هندسية فإن $b = -8$
- د. إذا كان أساس المتتابعة الهندسية موجباً فإن جميع حدودها موجبة.
- هـ. إذا كانت $\langle 4, x, 16, \dots \rangle$ متتابعة هندسية فإن $x = -8$
- و. إذا كانت $\langle \dots, a_4, a_3, a_2, a_1, \dots \rangle$ متتابعة هندسية فإن:

$$a_1/a_2 = a_3/a_4$$

ز. إذا كان $U_n = 3 U_{n+1}$ حد من حدود متتابعة هندسية فإن أساسها 3

2. اكتب الحدود الخمسة الأولى لكل من المتتابعات الهندسية الآتية التي فيها :

- أ. $a = 81, \quad r = 1/3$
- ب. $a = 1/32, \quad r = -2$
- ج. $a = 27, \quad r = -2/3$
- د. $a = -8, \quad U_{n+1} = \frac{1}{2} U_n$
- هـ. $a = 2, \quad r = 2$

3. جد الحد الثامن من المتتابعة الهندسية $\langle 2, 1, 1/2, \dots \rangle$
4. متتابعة هندسية حدها الرابع = 8 - وحدها السابع = 64 - فما حدها الاول وما أساسها ؟
5. أدخل 9 أعداد بين 3,96 بحيث تكون مع هذين العددين متتابعة هندسية .
6. مجموع الحدين الاول والثاني من متتابعة هندسية = 32 - ومجموع حديها الرابع و الخامس = 4 - فما حدها السابع ؟
7. اكتب المتتابعة الهندسية التي مجموع الحدود الستة الاولى منها 504 وأساسها = 2
8. إذا كان مجموع متتابعة هندسية أساسها = 3 هو 728 وحدها الاخير هو 486 جد حدها الاول وعدد حدودها .
9. متتابعة هندسية موجبة الحدود حاصل ضرب حدودها الثلاثة الاولى $1/27$ ومجموع حدودها الثاني والثالث والرابع $13/27$ أوجد المتتابعة؟ ثم جد مجموعها الى مالانهاية؟
- ج/ $\langle 1, 1/3, 1/9, 1/27 \rangle$
- $S_{\infty} = 3/2$
10. ثلاثة اعداد مكونة متتابعة حسابية مجموعها (18) ولو اضيفت الاعداد 1،2،7 الى حدودها على الترتيب لتألف من الاعداد الناتجة متتابعة هندسية فما هذه الاعداد ؟
11. متتابعة حسابية حدها الاول (3) فإذا كان حدها الثاني والرابع والثامن تؤولف متتابعة هندسية . اوجد المتتابعة الحسابية .
12. اذا كان مجموع ثلاثة اعداد تؤولف متتابعة هندسية يساوي (70) فإذا ضربنا كل من حدها الأول والثالث في (4) وحدها الثاني في (5) كانت الأعداد الناتجة تؤولف متتابعة حسابية فما هذه الأعداد ؟

Chapter 3

القطوع المخروطية Conic Sections

- نبذة تاريخية
- مقدمة
- [3-1] الدائرة
- [3-2] معادلة الدائرة القياسية
- [3-2-1] معادلة الدائرة اذا مست احد المحورين أو كليهما
- [3-2-2] المعادلة العامة للدائرة
- [3-3] معادلة مماس الدائرة

المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
مركز الدائرة	$c (h,k)$
نصف قطر الدائرة	r
القياسية معادلة الدائرة	$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$
العامة	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$

القطوع المخروطية

نبذة تاريخية:

في الألفية الثالثة قبل الميلاد كان قدماء البابليين والمصريين رواداً في الهندسة حيث طوروا صيغاً لإيجاد المساحات وحجوم بعض المجسمات البسيطة وأستخدموا الهندسة لقياس مساحة الأرض وحساب المثلثات لقياس الزوايا والميل في البناء وكان البابليون يستعملون الهندسة في التنبؤ بمواعيد كسوف الشمس وخسوف القمر. وكان المصريون يستخدمون الهندسة في بناء المعابد وتحديد زوايا الاهرامات وتحديد مساحة الدائرة بالتقريب. وفي القرن الثالث قبل الميلاد عني الأغريق بدراسة الاشكال للسطوح حيث ظهر في العصر اليوناني رياضيون ننوه بثلاثة منهم:

- أقليدس (283 ق.م) الذي حظي كتابه ((الاصول)) عند العرب بما لم يحظ به مؤلف رياضي آخر حيث تناول في المقالة الثالثة من كتابه عن الدائرة.
- أرخميدس (أرشميدس) (212 ق.م) كان بالنسبة للعرب رائداً في الهندسة المساحية والميكانيكية ، عرفوا قدرأ عن قليل من كتبه وخاصة كتاب الدائرة وقياسها حيث في القرن الثالث قبل الميلاد عمم هذا العالم الاغريقي طريقة (الاستنفاذ) مستخدماً مضلعاً من 96 ضلعاً لتعريف الدائرة .
- أبو اللونيوس (180 ق.م) أتجه هذا العالم نحو القطاعات المخروطية فحدد أشكالها وبيّن خواصها وعلاقاتها وقد عرف له العرب ذلك واحتفظوا بقدر من مؤلفاته وأهمها كتاب المخروطات يقع في ثمان مقالات .

وفي العصر الاسلامي كانت عناية العالم العربي ابن سينا بالكتاب فاقت بكثير عناية غيره فالجزء الهندسي من رياضيات كتاب الشفاء خير دليل على ذلك.


أما الدور الذي قام به العلماء العرب فهو الذي مهد الأذهان والعقول للدوار التي قام بها البشر فيما بعد ومنهم محمد بن محمد بن يحيى البوزجاني ولد سنة 328 هـ حيث أستطاع أن يجد حلولاً تتعلق بالقطع المكافئ الذي مهد لعلماء ورجال الفكر العربي أن يتقدموا خطوات بالهندسة التحليلية قادتهم الى علم التفاضل والتكامل الذي يعد أروع ما توصل اليه العقل البشري والذي سهل عملية الاختراعات.




أبن سينا

المقدمة:

يتولد المخروط الدائري القائم من دوران المثلث ABC القائم الزاوية في B دورة كاملة حول



شكل (1)



شكل (2)

أحد الضلعين القائمين كمحور الدوران كما في الشكل (1)

الآن تأمل المخروط الدائري القائم في الشكل (2)

الناتج من دوران مستقيم حول محور ثابت وبزاوية

ثابتة بين المستقيم والمحور. سيتولد من هذا الدوران

مخروط من مولدين يتقاطعان في الرأس (C).

ويسمى كل من L بمحور المخروط، AB

بمولد المخروط (محور المخروط الدائري القائم يساوي

قطعة المستقيم المحددة بالرأس ومركز القاعدة والمولد هو

قطعة المستقيم المحددة بالرأس واحدى نقط محيط القاعدة)

وللحصول على القطوع المخروطية (أشكال هندسية) هندسياً

من قطع المخروط الدائري القائم بمستو ضمن شرط خاص

لكل حالة (ضمن مفهوم الهندسة الأقليدية) فإذا قطع سطح

المخروط الدائري القائم.

أولاً: بمستو عمودي على المحور L ويوازي القاعدة ولا يحتوي على الرأس (C) فإن المقطع يمثل

دائرة (Circle) وتكبر هذه الدائرة كلما ابتعدنا عن الرأس والعكس صحيح. كما في الشكل (3)

ثانياً: بمستو موازٍ لأحد مولداته فإن المقطع يمثل شكلاً هندسياً يسمى القطع المكافئ $Parabola$.


كما في الشكل (4).

ثالثاً: بمستو غير موازٍ لقاعدته ولا يوازي أحد مولداته فإن المقطع يمثل شكلاً هندسياً يسمى بالقطع


الناقص (Ellipse). كما في الشكل (5).

رابعاً: بمستو يوازي محوره L ويقطع مولدين من مولدات المخروط الدائري القائم فإن المقطع يمثل


شكلاً هندسياً يسمى بالقطع الزائد (Hyperbola). كما في الشكل (6)




شكل (3)



شكل (4)



شكل (5)




شكل (6)

[3-1] الدائرة (Circle):

هي مجموعة النقط في المستوي التي يكون بعدها من نقطة ثابتة تسمى (المركز Center) يساوي مقداراً ثابتاً يسمى (نصف القطر Radius). لذا سنرمز لمركز الدائرة بالرمز $C(h, k)$ ، ونرمز لنصف قطر الدائرة بالرمز (r) .
أي أن الدائرة بلغة المجموعات

$$\text{Circle} = \{ p : p c = r , r > 0 \}$$

حيث $p(x, y)$ هي نقطة (point) في المستوي (plane)



[3-2] معادلة الدائرة القياسية Characteristic Equation of Circle

دائرة مركزها $C(h, k)$ ، ونصف قطرها (r) من الوحدات حيث $r > 0$ والنقطة $p(x, y)$ نقطة في المستوي الأحداثي فأن :

$$p c = r$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r \quad \text{وبتربيع الطرفين}$$

$$\Rightarrow (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad \text{الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة}$$

حالة خاصة:

في حالة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل $(0, 0)$ ونصف قطرها (r) تصبح الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة هي : $x^2 + y^2 = r^2$

أمثلة:

مثال 1

جد معادلة الدائرة التي مركزها $(5, 3)$ ونصف قطرها (4) وحدات

الحل:

من الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\therefore (x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 4^2$$

$$\therefore (x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

مثال 2

جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل ونصف قطرها (6) وحدات

$$C(h, k) = C(0, 0), \quad r = 6 \quad \text{وحدات}$$

الحل :

$$\therefore (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\therefore (x + 0)^2 + (y - 0)^2 = 36 \Rightarrow x^2 + y^2 = 36$$

مثال 3

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها $(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 49$

الحل :

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

بالمقارنة مع المعادلة القياسية

$$c(h, k) = c(5, -3)$$

$$\therefore r^2 = 49 \Rightarrow r = \sqrt{49} = 7 \quad \text{وحدات}$$

ملاحظة:

لقد تعلمت في الصف الرابع العلمي بعض القوانين منها:


أولاً: قانون البعد (المسافة) بين نقطتين $p_1(x_1, y_1)$, $p_2(x_2, y_2)$ يعطى بالعلاقة

$$p_1 p_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ثانياً: قانون البعد بين المستقيم L الذي معادلته $Ax + By + C = 0$ والنقطة الخارجة عنه

$p(x_1, y_1)$ يعطى حسب العلاقة


$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



ثالثاً: تنصيف قطعة مستقيم $\overline{p_1 p_2}$ حيث $p_1(x_1, y_1)$, $p_2(x_2, y_2)$ في المستوي الاحداثي المتعامد

ويعطى حسب العلاقة

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$



$$\therefore p(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

نقطة التنصيف

أمثلة :

مثال 1

جد معادلة الدائرة التي مركزها $c(4, 3)$ وتمر بالنقطة $p(2, 1)$

الحل :

$$\therefore pc = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\therefore pc = \sqrt{(4 - 2)^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}$$

$$\therefore r = pc = \sqrt{8}$$

$$\therefore (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 8 \quad \text{المعادلة القياسية للدائرة}$$

مثال 2

جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان $p_2(-2, 3)$, $p_1(4, 5)$

الحل :

$\overline{p_1 p_2}$ منتصف $c(x, y)$

$$\therefore x = (x_1 + x_2)/2 = (4 + (-2))/2 = (4-2)/2 = 1$$


$$y = (y_1 + y_2)/2 = (5 + 3)/2 = 8/2 = 4$$

$$\therefore c(1, 4)$$

$$\therefore r = p_1 c = \sqrt{(4 - 1)^2 + (5 - 4)^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \text{ units}$$

$$\therefore r = \sqrt{10} \text{ unit}$$

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 10 \quad \text{المعادلة القياسية}$$



ملاحظة: طريقة ثانية في إيجاد معادلة الدائرة عن طريق استخدام القاعدة التالية:

إذا كانت $p_2(x_2, y_2)$, $p_1(x_1, y_1)$ هي إحداثيات نهايتي قطر فيها فإن معادلة الدائرة هي:

$$x^2 + y^2 - x(x_1 + x_2) - y(y_1 + y_2) + x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$$

فيكون حل المثال السابق هو

$$x^2 + y^2 - x(4+(-2)) - y(5+3) + 4(-2) + (5)(3) = 0$$

$$x^2 + y^2 - x(2) - 8y - 8 + 15 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 8y + 7 = 0$$

لاحظ المعادلة القياسية في الحل الاول للمثال.

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 10$$

هي

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 8y + 7 = 0$$

وبتبسيط المعادلة

مثال 3


جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمس المستقيم $3x - 4y - 15 = 0$

$$d = \frac{|3x_1 - 4y_1 - 15|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|(3)(0) - (4)(0) - 15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|-15|}{5} \quad \text{الحل :}$$

$$d = 15/5 = 3 \text{ units}$$

$$\therefore d = r = 3 \text{ units}$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 9$$





[3-2-1] معادلة الدائرة اذا مست أحد المحورين أو كليهما.


إذا مست الدائرة التي مركزها (h, k) ونصف قطرها (r)

• محور السينات فإن $r = |k|$ ونقطة التماس هي $(h, 0)$

• محور الصادات فإن $r = |h|$ ونقطة التماس هي $(0, k)$

• المحورين الأحداثيين فإن $r = |h| = |k|$ ونقطتا التماس هما $(h, 0)$ ، $(0, k)$





فاذا الدائرة تماس المحورين وتقع في

أولاً: الربع الأول يكون مركزها (r, r)

ثانياً: الربع الثاني يكون مركزها $(-r, r)$

ثالثاً: الربع الثالث يكون مركزها $(-r, -r)$

رابعاً: الربع الرابع ويكون مركزها $(r, -r)$

أمثلة :

مثال 1

جد معادلة الدائرة التي تماس المحور السيني ومركزها $(3, 2)$

الحل :

بما أن الدائرة تماس المحور السيني

$$\therefore r = |k| = |2| = 2 \text{ unit}$$

$$\therefore (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\therefore (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

وبتبسيط المعادلة نحصل على

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0 \quad \text{المعادلة العامة}$$

ملاحظة:

يمكن إيجاد معادلة الدائرة التي تماس المحور السيني بطريقة أخرى حسب القاعدة.

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 = 0$$

حيث يكون الحل حسب هذه القاعدة للمثال الاول

$$x^2 + y^2 - 2(3x) - 2(2y) + (3)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0 \quad \text{المعادلة}$$

مثال 2

جد معادلة الدائرة التي تماس المحور الصادي ومركزها $(4, -1)$

الحل :

بما أن الدائرة تماس المحور الصادي

$$\therefore r = |h| = |4| = 4 \text{ units}$$

$$\therefore (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\therefore (x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 16 \quad \text{المعادلة القياسية}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0 \quad \text{بالتبسيط}$$

ملاحظة:

يمكن إيجاد معادلة الدائرة التي تمس المحاور الصادي بطريقة أخرى حسب القاعدة.

$$x^2 + y^2 - 2 h x - 2 k y + k^2 = 0$$

فيكون الحل حسب القاعدة

$$x^2 + y^2 - 2 h x - 2 k y + k^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2 (4) x - 2 (-1) y + (-1)^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0 \quad \text{المعادلة}$$

مثال 3

جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين الأحداثيين ومركزها $(4, -4)$

بما أن الدائرة تمس المحورين

الحل :

$$\therefore r = |h| = |k|$$

$$\therefore r = |4| = |-4| = 4 \text{ units}$$

$$\therefore r = 4 \text{ units}$$

$$\therefore (x - 4)^2 + (y + 4)^2 = 16 \quad \text{المعادلة القياسية}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8x + 8y + 16 = 0 \quad \text{المعادلة العامة}$$



ملاحظة:

يمكن إيجاد معادلة الدائرة بطريقة أخرى بتطبيق القاعدة في الملاحظة (1) أو (2) حيث

نحصل على المعادلة

$$x^2 + y^2 - 2 (4) x - 2 (-4) y + 16 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8x + 8y + 16 = 0$$

مثال 4

جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتقع في الربع الثالث ونصف قطرها 5 وحدات

الحل :

بما أن الدائرة تمس المحورين وتقع في الربع الثالث

$$\therefore C (-r, -r) = C (-5, -5)$$

$$\therefore (x + 5)^2 + (y + 5)^2 = 25 \quad \text{المعادلة القياسية}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 10x + 10y + 25 = 0 \quad \text{وبالتبسيط}$$

ملاحظة:

يمكن حل المثال بطريقة اخرى بتطبيق المعادلة حيث يكون الحل

$$x^2 + y^2 - 2 h x - 2 k y + C = 0$$

$$C (-5, -5) = (h, k)$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2 (-5)x - 2 (-5) y + 25 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 10 x + 10 y + 25 = 0$$

مثال 5

جد معادلة الدائرة المارة بالنقطة $p(2, 1)$ وتمس المحورين الاحداثيين.

الحل:

بما أن الدائرة تمس المحورين الأحداثيين

$$\therefore r = |h| = |k|$$

$$\therefore (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \dots\dots\dots(1)$$

نعوض عن $k = r, h = r$ في معادلة (1)

$$\Rightarrow (x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

$p(2, 1)$ تحقق معادلة الدائرة

$$\therefore (2 - r)^2 + (1 - r)^2 = r^2$$

$$\therefore 4 - 4r + r^2 + 1 - 2r + r^2 = r^2$$

$$\therefore r^2 - 6r + 5 = 0$$

$$(r - 5)(r - 1) = 0$$

$$\Rightarrow r = 5 \quad \text{or} \quad r = 1$$

$$\therefore r = 5 \Rightarrow C(5, 5)$$

$$\therefore (x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25 \quad \text{المعادلة (1)}$$

$$\text{or } r = 1 \Rightarrow C(1, 1)$$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1 \quad \text{المعادلة (2)}$$

[3-2-2] المعادلة العامة للدائرة General Equation of Circle

معادلة الدائرة بصورتها العامة ناتجة من تبسيط المعادلة القياسية

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 - r^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + C = 0 \quad \text{تصبح المعادلة}$$

$$A = -2h, \quad B = -2k \quad \text{واذا فرضنا}$$

$$C = h^2 + k^2 - r^2$$

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad \text{تصبح معادلة الدائرة بالصورة}$$

$$r = \sqrt{h^2 + k^2 - C} > 0, \quad K = -B/2, \quad h = -A/2 \quad \text{أي أن}$$

ملاحظة:

من المعادلة العامة للدائرة نلاحظ أن

* معادلة من الدرجة الثانية للمتغيرين x, y

* معامل x^2 = معامل y^2 ((الافضل ان يكون 1))

* المعادلة خالية من الحد xy

* $r > 0$ أي أن $\sqrt{(h^2 + k^2 - C)} > 0$

أمثلة:

مثال 1

اي المعادلات الآتية يمثل معادلة دائرة:

a. $x^3 + y^3 - 2x + 6y - 9 = 0$

b. $3x^2 - 3y^2 - 2x + 6y - 19 = 0$

c. $x^2 + y^2 - 5xy - 2x + 6y - 19 = 0$

d. $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 19 = 0$

e. $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 19 = 0$

الحل:

a. لا تمثل معادلة دائرة لأنها معادلة من الدرجة الثالثة

b. لا تمثل معادلة الدائرة لان معامل $x^2 \neq$ معامل y^2

c. لا تمثل معادلة الدائرة لانها تحتوي على الحد xy .

d. لا تمثل معادلة الدائرة حيث

$$h = -(-2)/2 = 1, \quad k = -6/2 = -3, \quad C = 19$$
$$\therefore r = \sqrt{h^2 + k^2 - c} = \sqrt{1 + 9 - 19} = \sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$$

لا تمثل معادلة الدائرة .

e. تمثل معادلة دائرة حيث:

$$h = 1, \quad k = -3, \quad c = -19$$
$$\therefore r = \sqrt{h^2 + k^2 - c} = \sqrt{1 + 9 + 19} = \sqrt{29} > 0$$

مثال 2

جد إحداثيات مركز ونصف قطر الدائرة $2x^2 + 2y^2 + 12x - 8y + 6 = 0$

الحل :

نجعل معامل x^2 = معامل y^2 = 1

$$\therefore [2x^2 + 2y^2 + 12x - 8y + 6 = 0] \quad \div 2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 4y + 3 = 0$$

$$\therefore C (-A/2, -B/2) = C (-6/2, 4/2)$$

$$\therefore C (-3, 2) \quad \text{المركز}$$

$$\therefore r = \sqrt{h^2 + k^2 - c} = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2 - 3} = \sqrt{9 + 4 - 3} = \sqrt{10}$$

$$\therefore r = \sqrt{10} \quad \text{units}$$

مثال 3

أكتب المعادلة العامة للدائرة التي مركزها $C (1, -3)$, $r = 2$ وحدات

الحل :

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 4$$

تبسيط المعادلة

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 6y + 9 = 4$$

المعادلة العامة :

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$$

مثال 4

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين $p_1(1, -2)$, $p_2(4, -3)$ ويقع مركزها على محور

الصادات .

الحل :

بما ان الدائرة يقع مركزها على محور الصادات

$$\therefore C(0, k)$$

$$\therefore r = p_1 C = \sqrt{(0-1)^2 + (k+2)^2} = \sqrt{1 + (k+2)^2}$$

$$r = p_2 C = \sqrt{(0-4)^2 + (k+3)^2} = \sqrt{16 + (k+3)^2}$$

$$\therefore \sqrt{1 + (k+2)^2} = \sqrt{16 + (k+3)^2} \quad \text{وبتريع الطرفين}$$

$$1 + (k+2)^2 = 16 + (k+3)^2 \quad \text{بالتبسيط}$$

$$\therefore 1 + k^2 + 4k + 4 = 16 + k^2 + 6k + 9$$

$$\Rightarrow 2k = -20 \Rightarrow k = -20/2 = -10$$

$$\therefore C(0, -10)$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{1 + (-10+2)^2} = \sqrt{65} \quad \text{units}$$

$$\therefore x^2 + (y+10)^2 = 65$$

مثال 5

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط $p_1(0, 0)$, $p_2(2, 0)$, $p_3(3, -1)$

الحل :

$$x^2 + y^2 + Ax + By + c = 0 \quad \text{معادلة الدائرة العامة} \quad (1) \dots\dots$$

$$p_1(0, 0) \quad \text{تحقق المعادلة (1)}$$

$$\Rightarrow 0^2 + 0^2 + A(0) + B(0) + c = 0$$

$$\Rightarrow c = 0 \quad \dots\dots (2)$$

$$p_2(2, 0) \quad \text{تحقق المعادلة (1)}$$

$$\Rightarrow 4 + (0)^2 + 2A + B(0) + 0 = 0 \quad (c = 0) \quad (2) \text{ من معادلة}$$

$$\Rightarrow 2A = -4 \Rightarrow A = -2 \quad \dots\dots (3)$$

$$p_3(3, -1) \quad \text{تحقق المعادلة (1)}$$

$$\Rightarrow 3^2 + (-1)^2 + 3A + B(-1) + c = 0 \quad \dots\dots (4)$$

$$\text{نعوض } c = 0, A = -2 \text{ في معادلة (4)}$$

$$\Rightarrow 10 + 3(-2) - B + 0 = 0$$

$$\Rightarrow 10 - 6 - B = 0 \Rightarrow 4 - B = 0 \Rightarrow B = 4$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0 \quad \text{المعادلة}$$

مثال 6

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين $p_1 (2, 1)$, $p_2 (-1, 1)$ ويقع مركزها على المستقيم الذي معادلته $2x - 4y - 5 = 0$

الحل :

المعادلة العامة للدائرة $x^2 + y^2 + Ax + By + c = 0$

تحقق المعادلة العامة $p_1 (2, 1)$

$$\Rightarrow 4 + 1 + 2A + B + c = 0$$

$$\Rightarrow 5 + 2A + B + c = 0 \quad \dots(1)$$

تحقق المعادلة العامة $p_2 (-1, 1)$

$$\Rightarrow 2 - A + B + C = 0 \quad \dots(2)$$

من معادلة (1) و (2)

$$\mp 2 \pm A \mp B \mp C = 0$$

بالطرح

$$3 + 3A = 0$$

$$\Rightarrow 3A = -3 \Rightarrow A = -3/3 \Rightarrow A = -1 \quad \dots(3)$$

مركز الدائرة $C (-A/2, -B/2)$

مركز الدائرة يحقق معادلة المستقيم $2x - 4y - 5 = 0$

$$\Rightarrow -A + 2B - 5 = 0 \quad \dots(4)$$

نعوض (3) في (4) نحصل على $2B = 4 \Rightarrow B = 2$

نعوض في معادلة (1) $A = -1, B = 2$

$$\Rightarrow 5 + 2(-1) + 2 + c = 0 \Rightarrow 5 - 2 + 2 + c = 0 \Rightarrow c = -5$$

$$x^2 + y^2 - x + 2y - 5 = 0 \quad \text{المعادلة}$$

[3-3] معادلة مماس الدائرة عند نقطة

لأيجاد معادلة مماس الدائرة هناك طريقتان:-

* الطريقة الأولى:-

أولاً : نوجد ميل نصف القطر المار بنقطة التماس

ثانياً : نستنتج ميل المماس أنه عمود على نصف القطر المار بنقطة التماس (مقلوبة بعكس الإشارة)

ثالثاً : نجد معادلة المماس بمعلومية ميله ونقطة التماس.

حيث درسنا في المرحلة السابقة معادلة المستقيم على الصورة $Ax + By + C = 0$

حيث A, B لا يساويان الصفر معاً

معادلة المستقيم :

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

أولاً : المار بالنقطتين $P_2(x_2, y_2)$, $P_1(x_1, y_1)$ هي

ثانياً : اذا علم ميل المستقيم ونقطة عليه هي $y - y_1 = m (x - x_1)$

حيث (m) تعني الميل (slope)

ميل المماس اذا:-

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ فإن } P_2(x_2, y_2) , P_1(x_1, y_1) \text{ مرراً بالنقطتين}$$

ثانياً : علمت معادلته $Ax + By + C = 0$, حيث A, B لا يساويان صفر معاً.

$$m = \frac{-A}{B} \text{ فإن}$$

ثالثاً : كان المستقيم المماس يصنع زاوية موجبة قياسها θ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

فإن ميل المماس يساوي ظل الزاوية θ أي أن $m = \tan \theta$

رابعاً : المستقيم موازي للمحور السيني فإن $m = 0$

العلاقة بين مستقيمين متوازيين أو متعامدين هما

* اذا توازي مستقيمان فإن ميلهما متساويين اي ان $m_1 = m_2$.

* اذا تعامد مستقيمان فإن حاصل ضرب ميلهما يساوي (-1)

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \text{ اي ان}$$

* الطريقة الثانية:

من معادلة الدائرة

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + c = 0 \text{ حيث المركز } (h, k)$$

وعند النقطة $p(x_1, y_1)$ الواقعة عليها تكون معادلة المماس هي :

$$xx_1 + yy_1 - h(x+x_1) - k(y+y_1) + c = 0$$

حيث

$$x^2 \text{ بدل } x x_1$$

$$y^2 \text{ بدل } y y_1$$

$$2x \quad \text{بدل} \quad x + x_1$$

$$2y \quad \text{بدل} \quad y + y_1$$

مثال 1

أوجد معادلة مماس الدائرة $x^2 + y^2 = 5$ عند النقطة $p(1, 2)$

الحل :

$$x^2 + y^2 = 5$$

$$\therefore c = (0, 0)$$

$$\therefore m_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 0}{1 - 0} = 2 \quad (\text{ميل نصف القطر})$$

وبما أن المماس \perp على نصف القطر في نقطة التماس

$$\therefore m_2 = -1/2 \quad \text{ميل المماس}$$

$$\therefore (y - y_1) = m_2 (x - x_1)$$

$$\Rightarrow (y - 2) = (-1/2) (x - 1) \quad (\text{بضرب طرفي المعادلة بـ 2})$$

$$\Rightarrow 2y - 4 = -x + 1$$

$$\therefore x + 2y - 5 = 0 \quad \text{معادلة المماس}$$

يمكن حل المثال السابق بالطريقة الثانية

$$\Rightarrow c(0, 0) \quad \text{من معادلة الدائرة}$$

$$(1, 2) \quad \text{نقطة التماس}$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + c = 0 \quad \text{من معادلة الدائرة}$$

نعوض المركز $c(0, 0)$ ونقطة التماس $(1, 2)$ في معادلة الدائرة. لإيجاد (c)

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 - 2(0)(1) - 2(0)(2) + c = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 4 + c = 0 \Rightarrow c = -5$$

$$\Rightarrow xx_1 + yy_1 - h(x + x_1) - k(y + y_1) + c = 0 \quad \text{معادلة المماس}$$

$$\Rightarrow x(1) + y(2) - 0(x + 1) - 0(y + 2) - 5 = 0$$

$$\Rightarrow x + 2y - 5 = 0 \quad \text{معادلة المماس}$$

مثال 2

أولاً : جد معادلة المستقيم المماس للدائرة التي مركزها $(-1,4)$ عند النقطة $p(2,3)$:

الحل :

$$m = \frac{3-4}{2+1} = -\frac{1}{3} \quad \text{ميل نصف القطر}$$

$$\therefore m = 3 \quad \text{ميل المماس}$$

نقطة التماس $p(2,3)$

$$(y-y_1) = m(x-x_1)$$

$$y-3 = 3(x-2)$$

$$y-3 = 3x-6$$

$$\therefore 3x-y-3=0 \quad \text{معادلة المماس}$$

ثانياً : جد معادلة المستقيم المماس للدائرة $x^2+y^2-2x+4y=0$ عند النقطة $(-1,-1)$:

الحل :

$$h = \frac{-(-2)}{2} = 1, \quad k = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\therefore c(1,-2) \quad \text{المركز}$$

$$m = \frac{-2+1}{1+1} = -\frac{1}{2} \quad \text{ميل نصف القطر}$$


$$\therefore m = 2 \quad \text{ميل المماس}$$

$$\therefore (y-y_1) = m(x-x_1)$$

$$(y+1) = 2(x+1)$$

$$y+1 = 2x+2$$

$$\therefore 2x-y+1=0 \quad \text{معادلة المماس للدائرة}$$



1. بين أي من المعادلات الآتية تمثل معادلة دائرة .

a. $x^2 + 3y^2 - 2x + 3y = 0$

b. $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 12$

c. $x^2 + y^2 + 2xy = 1$

d. $x^2 + y^2 = 0$

e. $y = -2x$

2. جد معادلة الدائرة في كل حالة من الحالات الآتية :

أ. مركزها $c(3, -2)$ ونصف قطرها 5 وحدات

ب. مركزها نقطة الاصل وتمر بالنقطة $p(-4, 3)$

ج. مركزها $c(-1, 5)$ وتمر بالنقطة $p(4, 3)$

3. جد معادلة الدائرة التي نهايتي قطر فيها $p_1(2, -3)$, $p_2(4, 1)$ بثلاثة طرق مختلفة .

4. جد أحداثيات المركز ونصف قطر الدوائر الآتية : -

a. $(x+5)^2 + (y-4)^2 = 36$

b. $(x-2)^2 + y^2 = 9$

c. $2x^2 + 2y^2 + 3x + 4y = 0$

5. جد معادلة الدائرة التي تمس المستقيم $y=4$ ومركزها $c(-2, -3)$

6. جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين الاحداثيين وتمس المستقيم $y=6$

7. جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطة $(6, -3)$ وتمس المحورين الاحداثيين

8. جد معادلة الدائرة التي نصف قطرها 5 وحدات و تمس المحورين الاحداثيين والواقعة :-

أولاً : في الربع الثاني

ثانياً : في الربع الرابع

ثالثاً : في الربع الاول

9. اكتب المعادلة العامة للدائرة التي مركزها $(-3, 2)$ ونصف قطرها 4 وحدات .
10. جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين $p_1(3, -1)$ ، $p_2(5, 1)$ ويقع مركزها على محور السينات
11. بين موقع النقاط $p_1(3, 4)$ ، $p_2(2, -2)$ ، $p_3(-4, 4)$ بالنسبة للدائرة $x^2 + y^2 = 25$
12. جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط $p_1(1, 0)$ ، $p_2(0, 1)$ ، $p_3(3, 4)$.
13. أوجد معادلة المماس للدائرة $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 5$ عند النقطة $p(1, 1)$
14. أوجد معادلة مماس الدائرة $x^2 + y^2 = 5$ ، العمودي على المستقيم $2x - y = 1$

Chapter 4

الدوال الدائرية Circular Functions

- [4-1] نبذة تاريخية .
- [4-2] التطبيق اللاف .
- [4-3] دالة الظل .
- [4-4] دوال دائرية اخرى .
- [4-4-1] تعريف .
- [4-4-2] تعريف .
- [4-4-3] تعريف .
- [4-5] العلاقات بين الدوال الدائرية .
- [4-6] الزوايا المنتسبة .
- [4-7] قيم الدوال الدائرية للزاوية التي قياسها $(-\theta)$.
- [4-8] رسم منحنيات الدوال المثلثية .

المصطلح	الرمز او العلاقة الرياضية
الزاوية المنتسبة	$(n \times 90^\circ \pm \theta)$
قانون الجيب تمام	$\vec{A}^2 = \vec{B}^2 + \vec{C}^2 - 2\vec{B} \vec{C} \cos A$
قانون الجيب	$\frac{\vec{A}}{\sin A} = \frac{\vec{B}}{\sin B} = \frac{\vec{C}}{\sin C}$
المحور السيني	x-axis , $\vec{xx'}$
المحور الصادي	y-axis , $\vec{yy'}$

الفصل الرابع

الدوال الدائرية Circular Functions

[1-4] نبذة تاريخية :

عرف هذا العلم عند العرب بعلم الانساب وذلك لاستفادة من الأوجه المختلفة الناشئة من النسبة بين اطوال اضلاع المثلث ، واليهم يعود الفضل في جعله علماً منظماً له قوانينه الخاصة ومستقلاً عن الفلك الذي اعتبره اليونانيون علماً مساعداً لاعمالهم الفلكية .

وقد اضاف العرب اضافات هامة ودرسوا هذا العلم دراسة ممتازة عن الامم التي سبقتهم وبذلك اعتبر هذا العلم عربياً .

استعمل العرب النسبة المثلثية بدلاً من الاصطلاح (وتر ضعف القوس) الذي إستعمله اليونانيون وبذلك سهلوا الأعمال الرياضية وهم أول من أدخل (المماس - الظل) في اعداد النسب المثلثية ، وكذلك ظل التمام .

ان العالم العربي (أبو الوفاء البوزجاني) في القرن العاشر الميلادي هو الذي أدخل هذا الاصطلاح على أنه مأخوذ من ظلال الاجسام التي تتكون نتيجة سير الاشعة الضوئية المنبعثة من الشمس في خطوط مستقيمة .

وقد توصل العرب الى استخراج القواعد المتعلقة بالمثلثات الكروية القائمة وحل المسائل المتعلقة بالمثلثات الكروية المائلة وكذلك مساحات المثلثات الكروية ، واوجدوا الجداول الرياضية للجيب والظل والقاطع التمام واستعملوا طرقاً متنوعة لحساب هذه الجداول ، ووضعوا معادلات واشكالات لحل المشكلات التي صادفتهم .

وألف جابر بن الأفلح المتوفي في قرطبة في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد موسوعة من كتب في الفلك أولها في علم المثلثات الكروية .

ويعتبر البتاني (أبو عبد الله بن جابر بن سنان) المتوفي سنة 929 م من العلماء الذين ساعدوا على أن يصبح المثلثات علماً مستقلاً كذلك نبغ (ابن يونس المصري (1009 م)) في علم المثلثات وتوصل الى المتطابقة :


$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} \sin (x+y) + \frac{1}{2} \sin (x-y)$$

[4-2] التطبيق اللاف The winding mapping

ان التطبيق الذي يقرن اي عدد حقيقي بنقطة من دائرة الوحدة (Unit Circle) (أو بزاوية موجهة بالوضع القياسي) يسمى التطبيق اللاف .

وكما سبق أن تعلمت في الصف الرابع العلمي انه لو كانت لدينا زاوية موجهة في وضع قياسي مرسومة في دائرة الوحدة فأن لهذه الزاوية نقطة مثلثية واحدة وواحدة فقط .

ففي الشكل (4-1) النقطة المثلثية للزاوية \overrightarrow{AOB} هي A وهي تقاطع الضلع النهائي للزاوية مع دائرة الوحدة




$\therefore A$ تقع على الجزء الموجب من محور السينات
 $r = OA$, $r = 1$ (حيث r نصف قطر دائرة الوحدة)

$$\therefore A = (1, 0)$$

الشكل (4-1)

وفي الشكل (4-2) النقطة المثلثية للزاوية \overrightarrow{COD} هي D وهي نقطة تقاطع الضلع النهائي للزاوية مع دائرة الوحدة




$\therefore D$ تقع على الجزء الموجب من محور الصادات

$$\therefore D = (0, 1)$$

الشكل (4-2)

وفي الشكل (4-3) النقطة المثلثية للزاوية \overrightarrow{HOL} هي L وهي تقاطع الضلع النهائي للزاوية مع دائرة الوحدة




$\therefore L$ تقع على الجزء السالب من محور السينات

$$\therefore L = (-1, 0)$$


الشكل (4-3)

وبالمثل في الشكل (4-4) النقطة المثلثية للزاوية \overrightarrow{LOM} هي
 $\therefore M = (0, -1)$



الشكل (4-4)

وفي الشكل (4-5) النقطة المثلثية للزاوية \overrightarrow{MON} هي N حيث
 $N = (x, y) \therefore$



الشكل (4-5)

فاذا كانت θ عدداً حقيقياً ، وكانت $N = (x, y)$ النقطة الواقعة على دائرة الوحدة الموافقة للعدد θ فان العدد x هو $\cos \theta$ ويرمز له $\cos \theta$ حيث θ قياس الزاوية الموجهة بالوضع القياسي الذي يمر ضلعها النهائي من N
 اما العدد y هو $\sin \theta$ ويرمز له $\sin \theta$ حيث θ قياس الزاوية الموجهة بالوضع القياسي الذي يمر ضلعها النهائي من N

و بهذا نكون قد عرفنا دالتين مجال كل منهما R (مجموعة الاعداد الحقيقية) و المجال المقابل لكل منهما $[-1, 1]$ وذلك لانه مهما يكن $\theta \in R$ فان

$$-1 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$\text{و } -1 \leq \sin \theta \leq 1$$

تعريف

الجيب (sine) دالة مجالها R ومجالها المقابل $[-1,1]$ بحيث :

$$\forall \theta \in R : \sin \theta = y$$

حيث y الاحداثي الصادي للنقطة المثلثية .

جيب تمام (cosine) دالة مجالها R ومجالها المقابل $[-1,1]$ بحيث :

$$\forall \theta \in R : \cos \theta = x$$

حيث x الاحداثي السيني للنقطة المثلثية .

القياس الرئيس للزاوية :

ان اي زاوية موجهة بالوضع القياسي تقترن بمجموعة غير منتهية من الاعداد يدعى كل منها قياساً لهذه الزاوية . وقد جرت العادة على اعتبار القياس الدائري الذي يحقق العلاقة :

$$0 \leq \theta < 2\pi$$

أو القياس الستيني الذي يحقق العلاقة :

$$0 \leq \theta < 360^\circ$$

وهو القياس الرئيس للزاوية.

واضح أن هذا القياس وحيد ، وأن بقية القياسات تنتج باضافة $(2k\pi)$ حيث (k) عدد صحيح ، الى

القياس الرئيس θ حيث $\text{Angle} = 2k\pi + \theta$

مثال 1

اوجد القياس الرئيس لكل من الزوايا الآتية :

a) 8.75π

b) 66

الحل :

$$a) 8.75\pi = 8\pi + 0.75\pi$$

$$0.75\pi = \frac{3}{4}\pi \quad \text{نكن}$$

∴ القياس الرئيس للزاوية التي قياسها (8.75π) هو $(\frac{3}{4}\pi)$

$$\begin{aligned} \text{b) } 66 &= 66 \times \frac{7}{22} \Pi \\ &= 21 \Pi \\ &= 20 \Pi + \Pi \end{aligned}$$

∴ القياس الرئيس للزاوية هو $\Pi \simeq 3.14$

مثال 2

احسب $\sin(-7\Pi/2)$


الحل :

$$-7 \Pi / 2 = -4 \Pi + \Pi / 2$$

∴ القياس الرئيس للزاوية $-7\Pi / 2$ هو $\Pi/2$

$$\begin{aligned} \therefore \sin(-7\Pi/2) &= \sin \Pi/2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

(الاحداثي الصادي للنقطة المثلثية (0,1))



الشكل (4-6)



تمارين (4-1)



1. جد القياسات الرئيسة لكل من الزاوي التي قياساتها الآتية :

a. 21Π

b. $\frac{-15}{2} \Pi$

2. جد الاعداد الحقيقية الآتية :


a. $\sin \Pi / 3$

b. $\cos 19 \Pi / 6$

c. $\cos 24\Pi$

[4-3] دالة الظل (tangent) :

يمكن أن نحصل على هذه الدالة من دائرة الوحدة ، وذلك لو وضعنا مستقيماً مدرجاً على جميع الاعداد الحقيقية بحيث يكون مماساً للدائرة عند $A(1,0)$



الشكل (4-7)

(لاحظ الشكل (4-7)) وبشرط أن يكون العدد صفر منطبقاً على A فان نقطة تقاطع الضلع النهائي للزاوية θ مع هذا الخط يمثل $\tan \theta$.

تعريف

دالة الظل : \tan

$$\tan : \{ \theta : \theta \in \mathbb{R} , \cos \theta \neq 0 \} \rightarrow \mathbb{R} ,$$



$$\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$$

نلاحظ ان دالة الظل (\tan) هي الدالة الناتجة من $\sin \theta / \cos \theta$


ملاحظات :

1. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ فان الزاوية θ تقع في الربع الاول وتكون النقطة المثلثية (x,y) ، اي $\cos \theta > 0$ ، $\sin \theta > 0$ لاحظ الشكل (4-8)
2. اذا كانت $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ فان الزاوية θ تقع في الربع الثاني وتكون النقطة المثلثية $(-x,y)$ اي ان $\cos \theta < 0$ ، $\sin \theta > 0$


لاحظ الشكل (4-9)



3. إذا كانت $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ فإن الزاوية θ تقع في الربع الثالث وتكون النقطة المثلثية للزاوية θ هي $(-x, -y)$ وبهذا يكون :
 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta < 0$, $\tan \theta > 0$ فالنالي فإن
 كما في الشكل (4-10)



4. إذا كانت $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ فإن الزاوية θ تقع في الربع الرابع وتكون النقطة المثلثية للزاوية هي $(x, -y)$ وبهذا يكون:
 $\sin \theta < 0$, $\cos \theta > 0$, $\tan \theta < 0$ وبالتالي فإن
 كما في الشكل (4-11)



ويمكن وضع ماتقدم في الجدول الآتي :

الربع	sin	cos	tan
1	+	+	+
2	+	-	-
3	-	-	+
4	-	+	-

جدول اشارات الدوال المثلثية في الارباع

5 لتكن c دائرة الوحدة في الشكل (4-12)

B هي النقطة المثلثية للزاوية θ احداثياً B هي : $(\cos \theta, \sin \theta)$

نلاحظ أن $r = OB = 1$

$$BM = \sin \theta$$

$$OM = \cos \theta$$

وبما أن المثلث OMB قائم الزاوية في M

حسب مبرهنة فيثاغورس نستنتج أن :

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1$$

ملاحظة : نكتب عادة $\sin^2 \theta$ بدلاً من $[\sin \theta]^2$

وكذلك $\cos^2 \theta$ بدلاً من $[\cos \theta]^2$

وبالمثل نكتب $\sin^3 \theta$ بدلاً من $[\sin \theta]^3$ وهكذا

أي أن القاعدة السابقة يمكن أن تكتب :

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

مثال 3


جد $\tan \frac{5\pi}{3}$

الحل : الزاوية $\theta = \frac{5\pi}{3}$ تنتهي في الربع الرابع فنجد من المثلث OMB أن :

$$\tan \frac{5\pi}{3} = \frac{\sin \frac{5\pi}{3}}{\cos \frac{5\pi}{3}}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$= -\sqrt{3} \approx -1.732$$



$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

مثال 4

إذا كانت θ هو قياس الزاوية الموجهة بالوضع القياسي وكان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ فاوجد قيمة $\cos \theta$, $\tan \theta$ علماً أن ضلع الزاوية النهائي التي قياسها θ يقع في الربع الثاني .

الحل :

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$9/25 + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow$$

$$\cos^2 \theta = 1 - 9/25$$

$$= 16 / 25$$

$$\therefore \cos \theta = \pm 4/5$$

وبما أن θ تقع في الربع الثاني

$$\therefore \cos \theta < 0$$

$$\therefore \cos \theta = -4/5$$

$$\therefore \tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{-4}{5}} = -3 / 4$$

تمارين (2-4)

1. اوجد $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ اذا علمت ان الضلع النهائي للزاوية (x) الموجهة في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة في النقط المثلثية الآتية :

- | | |
|--|--|
| a. $\left(\frac{1}{\sqrt{5}} , -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$ | b. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3} , \frac{\sqrt{6}}{3} \right)$ |
| c. $\left(\frac{1}{2} , \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ | d. $(-0.6 , -0.8)$ |

2. جد ما يأتي :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. $\sin(30\Pi)$ | b. $\cos(-13\Pi/6)$ |
| c. $\tan(4\Pi/3)$ | d. $\cos(30\Pi)$ |

3. جد قيمة ما يأتي :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. $\sin^2 3 + \cos^2 3$ | b. $\cos^2 \Pi/6 - \sin^2 \Pi/6$ |
|--------------------------|----------------------------------|

4. تحقق مما يأتي :

$$\sin \frac{\Pi}{6} \cos \frac{\Pi}{3} + \cos \frac{\Pi}{6} \sin \frac{\Pi}{3} = \sin \frac{\Pi}{2}$$

[4-4] دوال دائرية أخرى :

عرفنا في البنود السابقة الدوال الدائرية : \sin , \cos , \tan

وباستخدام هذه الدوال يمكننا ان نعرف دوال أخرى وذلك كما يأتي :

1. الدالة cotangent (ظل تمام) ويرمز لها \cot وهي الدالة الناتجة من مقلوب الدالة (الظل)

. \tan

اي ان : $\cot x = 1 / \tan x$

$$= \cos x / \sin x$$

تعريف [4-4-1]

دالة ظل التمام \cot

$$\cot : \{ \theta : \theta \in \mathbb{R} , \sin \theta \neq 0 \} \rightarrow \mathbb{R} ,$$

$$\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta$$

اي ان الدالة \cot تعرف لكل الاعداد الحقيقية بشرط $(\sin \theta \neq 0)$.

2. الدالة secant (قاطع) ويرمز لها \sec وهي الدالة الناتجة من مقلوب الدالة (\cos)

$$\sec x = 1 / \cos x \quad \text{اي ان}$$

وهي تعرف لكل الاعداد الحقيقية x بشرط $(\cos x \neq 0)$ بعبارة أخرى

تعريف [4-4-2]

دالة القاطع \sec :

$$\sec: \{ \theta: \theta \in \mathbb{R} , \cos \theta \neq 0 \} \rightarrow \mathbb{R} ,$$

$$\sec \theta = 1 / \cos \theta$$

3. الدالة cosecant (القاطع التمام) ويرمز لها csc وهي الدالة الناتجة من مقلوب الدالة (sin)

$$\text{csc } x = 1/\sin x \quad \text{اي ان}$$

وهي تعرف لكل الاعداد الحقيقية x بشرط $(\sin x \neq 0)$

تعريف [3-4-4]

دالة قاطع التمام : csc

$$\text{csc}: \{ \theta : \theta \in \mathbb{R}, \sin \theta \neq 0 \} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\text{csc } \theta = 1/\sin \theta$$

مثال 5

إذا كان : $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ وكان $\sin x = 5/13$ فجد كلاً من :

$\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$

الحل :

$$\therefore \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\therefore (5/13)^2 + \cos^2 x = 1 \Rightarrow$$

$$\cos^2 x = 1 - 25/169$$

$$\Rightarrow \cos^2 x = 144/169$$

$$\Rightarrow \cos x = \pm 12/13$$

وبما ان $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ اي انها تقع في الربع الثاني

$$\therefore \cos x < 0$$

$$\therefore \cos x = -12/13$$

$$\therefore \tan x = \sin x / \cos x$$

$$\therefore \tan x = \frac{\frac{5}{13}}{\frac{-12}{13}}$$

$$\therefore \tan x = -5/12$$

$$\therefore \cot x = -12/5$$

$$\sec x = 1/\cos x = -13/12$$

$$\csc x = 1/\sin x = 13/5$$

[4-5] العلاقات بين الدوال الدائرية :

ميرھنة [4-5-1]

(المتطابقة الفيثاغورية)

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

2. $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x, \quad \forall x, x \neq (2n+1) \cdot \pi / 2$

حيث n اي عدد صحيح

3. $1 + \cot^2 x = \csc^2 x, \quad \forall x, x \neq n\pi$

حيث n اي عدد صحيح

4. $\sin (x \mp y) = \sin x \cos y \mp \cos x \sin y$

إذا كان $x = y$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

5. $\cos (x \mp y) = \cos x \cos y \pm \sin x \sin y$

إذا كان $x = y$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

1. لقد سبق برھنتھا في البنود السابقة .

2. إذا كان x اي عدد حقيقي ما عدا المضاعفات الفردية لـ $(\pi/2)$ والتي تجعل

$(\cos x \neq 0)$ فأننا نقسم طرفي المتطابقة (1) على $\cos^2 x$ لنحصل على :

$$(\sin x / \cos x)^2 + (\cos x / \cos x)^2 = (1 / \cos x)^2 \Rightarrow$$

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x, \quad \forall x, x \neq (2n+1)\pi/2$$

حيث n عدد صحيح

$$\tan x = \sin x / \cos x$$

وذلك لان :

$$1/\cos x = \sec x$$

3. وبالطريقة السابقة نفسها اذا كان $x \neq n\pi$ حيث n عدد صحيح ، يمكن قسمة طرفي المتطابقة

(1) على $\sin^2 x$ فنحصل على :

$$(\sin x / \sin x)^2 + (\cos x / \sin x)^2 = (1 / \sin x)^2 \Rightarrow$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x, \quad \forall x, x \neq n\pi$$

حيث n عدد صحيح

وذلك لان :

$$\frac{1}{\sin x} = \csc x , \quad \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

اثبت صحة المتطابقة الآتية :

مثال 6

$$\sec^2 x + \csc^2 x = \sec^2 x \csc^2 x , \quad \forall x , x \neq n \Pi/2$$

حيث n عدد صحيح

الاثبات : الطرف الايسر

$$\sec^2 x + \csc^2 x = 1/\cos^2 x + 1/\sin^2 x$$

$$= \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x}$$

$$= 1 / \cos^2 x \sin^2 x$$

$$= 1/ \cos^2 x \cdot 1/\sin^2 x$$

$$= \sec^2 x \csc^2 x$$

$$= \text{الطرف الايمن}$$

اثبت صحة المتطابقة الآتية :

مثال 7


$$\frac{3\cos^2 x - \sin^2 x + 1}{\sin^2 x} = 4 \cot^2 x$$

الاثبات : الطرف الايسر

$$\frac{3 \cos^2 x - \sin^2 x + 1}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{3 \cos^2 x + (1 - \sin^2 x)}{\sin^2 x} = \frac{3 \cos^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{4 \cos^2 x}{\sin^2 x} = 4 \cot^2 x \quad \text{الطرف الايمن}$$



تمارين (3-4)

1. إذا كان $3\frac{\pi}{2} < x < 2\pi$ وكان $\cos x = 2/3$ فجد قيمة كل من :
 $\csc x$, $\sec x$, $\cot x$

2. إذا كان $3\frac{\pi}{2} < x < \pi$ وكان $\tan x = 7/3$ فجد قيمة كل من :
 $\csc x$, $\sec x$, $\cot x$

3. اثبت صحة المتطابقات الآتية :

a. $\tan x = \sin x \sec x$

b. $\sec^2 x = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{1 - \sin^2 x}$

c. $(1 - \sin^2 x)(1 + \tan^2 x) = 1$

d. $\frac{1 - \cos^2 x}{\tan x} = \sin x \cos x$

e. $\frac{1 + \sin x - \sin^2 x}{\cos x} = \cos x + \tan x$

[4-6] الزاوية المنتسبة

تعريف

إذا كان θ قياس لزاوية حادة فأى زاوية قياسها على الصورة $(n \times 90^\circ \pm \theta)$ ، حيث n عدد صحيح (غير سالب) تسمى زاوية منتسبة للزاوية الحادة التي قياسها θ

فمثلاً : الزاوية التي قياسها (150°) منتسبة للزاوية الحادة (30°) لأن :

$$(150^\circ) = (2 \times 90^\circ - 30^\circ)$$

والزاوية 240° منتسبة للزاوية 60° لأن :

$$(240^\circ) = (2 \times 90^\circ + 60^\circ)$$

والزاوية 300° منتسبة للزاوية 60° لأن :

$$(300^\circ) = (4 \times 90^\circ - 60^\circ)$$

والزاوية -30° هي زاوية منتسبة للزاوية 30° لأن :

$$(-30^\circ) = (0 \times 90^\circ - 30^\circ)$$

واستناداً الى التعريف السابق فانه اذا كانت θ قياس زاوية حادة فأى الزوايا التي قياساتها :

$$(180^\circ - \theta), (180^\circ + \theta), (360^\circ - \theta), (360^\circ + \theta),$$

$$(90^\circ - \theta), (90^\circ + \theta), (0^\circ - \theta), (0^\circ + \theta),$$

$$(270^\circ - \theta), (270^\circ + \theta), \text{ هي زوايا منتسبة للزاوية } \theta.$$

فمثلاً :

$$240^\circ = (180^\circ + 60^\circ) \quad \text{أو} \quad 240^\circ = (270^\circ - 30^\circ)$$

$$135^\circ = (180^\circ - 45^\circ) \quad \text{أو} \quad 135^\circ = (90^\circ + 45^\circ)$$

$$300^\circ = (360^\circ - 60^\circ) \quad \text{أو} \quad 300^\circ = (270^\circ + 30^\circ)$$

$$330^\circ = (360^\circ - 30^\circ) \quad \text{أو} \quad 330^\circ = (270^\circ + 60^\circ)$$

ملاحظة: اذا كان قياس الزاوية اكبر من 360° (اي اكبر من 2π) نبدأ بطرح 360° أو مضاعفاتها

(او طرح 2π أو مضاعفاتهما إذا كانت بالقياس الدائري) ليصبح القياس رئيسياً أي يصبح قياس الزاوية ينتمي الى $[0, 360^\circ]$ أو ينتمي الى $[0, 2\pi)$.

جد $\cos 120^\circ$, $\sin 120^\circ$ دون استخدام الآلة الحاسبة.

مثال 8

الحل:

1. ان الزاوية \overrightarrow{AOB} التي قياسها 120° تقع في الربع الثاني. (لاحظ الشكل 13-5)

اذ أن: $B(x, y) = B(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ)$

ولكن $B \rightarrow B'$ تحت تأثير انعكاس في المحور Y


$$\therefore B'(x', y') = (\cos 60^\circ, \sin 60^\circ)$$

$$x = -x' \quad \text{ولكن}$$

$$\therefore \cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -1/2$$

$$y = y' \quad \text{كذلك}$$

$$\therefore \sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$



الشكل (13-4)

$$120^\circ = 180^\circ - 60^\circ \quad \text{وبما أن:}$$

$$= 2 \times 90^\circ - 60^\circ$$

$\therefore 120^\circ$ متنسبة للزاوية 60° .

من المثال السابق نلاحظ أن


$$\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -1/2$$

2. ان الزاوية \overrightarrow{AOB} التي قياسها 120° تقع في الربع الثاني كما اسلفنا اذ ان

$$B(x, y) = B(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ)$$

ولكن $B \rightarrow B'$ تحت تأثير دوران حول نقطة الأصل بزاوية قياسها 90° .



$$B'(x', y') \therefore B' = (-\sin 30^\circ, \cos 30^\circ)$$

$$B' = (\cos(90^\circ + 30^\circ), \sin(90^\circ + 30^\circ))$$

$$\therefore \cos(90^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -1/2$$

$$\sin(90^\circ + 30^\circ) = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$$

الشكل (4-14)

نشاط 1: باستخدام دائرة الوحدة والانعكاس في نقطة الأصل (0)، أوجد

$$\sin 210^\circ, \cos 210^\circ$$

نشاط 2: باستخدام دائرة الوحدة والانعكاس في المحور السيني اوجد

$$\sin 315^\circ, \cos 315^\circ$$

ملاحظات:

لايجاد قيم الدوال الدائرية لأية زاوية نتبع الآتي:

1. نجد القياس الرئيسي للزاوية اذا كان قياسها اكبر من 360° او اكبر من 2π
نضع قياس الزاوية الرئيسية على الصورة $(n\pi/2 \pm \theta)$ أو $(n \times 90^\circ \pm \theta)$

حيث n عدد صحيح موجب أي يأخذ القيم $(1, 2, 3, 4, \dots)$ θ قياس زاوية حادة.

2. اذا كان n عدد صحيح فردي، أي يأخذ القيم: $1, 3, 5, \dots$

فان قيم الدالة الدائرية للزاوية $(n\pi/2 \pm \theta)$ تتغير من:

$$\sin(n\pi/2 \pm \theta) \text{ الى } \cos$$

$$\text{ومن } \sin \theta \text{ الى } \cos(n\pi/2 \pm \theta)$$

$$\text{ومن } \tan(n\pi/2 \pm \theta) \text{ الى } \cot \theta$$

$$\text{ومن } \sec(n\pi/2 \pm \theta) \text{ الى } \csc \theta$$

$$\text{ومن } \cot(n\pi/2 \pm \theta) \text{ الى } \tan \theta$$

$$\text{ومن } \csc(n\pi/2 \pm \theta) \text{ الى } \sec \theta$$

مع مراعاة اشارة الدالة في الربع الذي تقع فيه الزاوية $(n\pi/2 \pm \theta)$

ب. اذا كان n عدد زوجي موجب أي تأخذ القيم: $2, 4, 6, \dots$

فان قيم الدالة الدائرية للزاوية $(n\pi/2 \pm \theta)$ لا تتغير وتظل كما هي

اي $\sin(n\pi/2 \pm \theta)$ تؤول الى $\sin \theta$ وكذلك $\cos(n\pi/2 \pm \theta)$

تؤول الى $\cos \theta$ ، وهكذا بقية الدوال الاخرى، مع مراعاة اشارة الدالة في الربع الذي تقع في الزاوية $(n\pi/2 \pm \theta)$

ج. يحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية θ وننسبها لاحدى زاويتي هذا الربع. فمثلاً:

في الربع الاول: ننسب للزاوية $\theta - 90^\circ$ الى $360^\circ + \theta$

وفي الربع الثاني: ننسب للزاوية $\theta + 90^\circ$ الى $180^\circ - \theta$

وفي الربع الثالث: ننسب للزاوية $\theta + 180^\circ$ الى $270^\circ - \theta$

وفي الربع الرابع: ننسب للزاوية $\theta + 270^\circ$ الى $360^\circ - \theta$

جد قيم الدوال الدائرية للزوايا التي قياساتها:

مثال 9

$30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ, 420^\circ$

الحل:

أ. الزاوية التي قياسها 30° تقع في الربع الاول

$$\therefore \sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2, \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$$

$$\csc 30^\circ = 2, \sec 30^\circ = 2/\sqrt{3}, \cot 30^\circ = \sqrt{3}$$

ب. الزاوية التي قياسها 150° تقع في الربع الثاني

$$\therefore \sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ) \text{ or } = \sin 30^\circ = 1/2$$

$$\sin 150^\circ = \sin (90^\circ + 60^\circ) = \cos 60^\circ = 1/2$$

$$\cos 150^\circ = \cos (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ = -\sqrt{3}/2$$

or

$$\cos 150^\circ = \cos (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\sin 60^\circ = -\sqrt{3}/2$$

$$\tan 150^\circ = \tan (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\tan 30^\circ = -1/\sqrt{3}$$

or

$$\tan 150^\circ = \tan (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\cot 60^\circ = -1/\sqrt{3}$$

$$\cot 150^\circ = \cot (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\cot 30^\circ = -\sqrt{3}$$

or

$$\cot 150^\circ = \cot (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\sec 150^\circ = \sec (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\sec 30^\circ = -2/\sqrt{3}$$

or

$$\sec 150^\circ = \sec (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\csc 60^\circ = -2/\sqrt{3}$$

$$\csc 150^\circ = \csc (180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \csc 30^\circ = 2$$

or

$$\csc 150^\circ = \csc (90^\circ + 60^\circ)$$

$$= \sec 60^\circ = 2$$

→ الزاوية التي قياسها 210° تقع في الربع الثالث

$$\therefore \sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ = -1/2$$

or

$$\sin 210^\circ = \sin (270^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ = -1/2$$

نشاط: اكمل قيم الدوال المثلثية الباقية للزاوية التي قياسها 210°

د. الزاوية التي قياسها 330° تقع في الربع الرابع

$$\sin 330^\circ = \sin (360^\circ - 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ = -1/2$$

or

$$\sin 330^\circ = \sin (270^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ = -1/2$$

نشاط: اكمل قيم الدوال المثلثية الباقية للزاوية التي قياسها 330°

هـ. الزاوية التي قياسها $420^\circ = 60^\circ + 360^\circ$

ان قيم الدالة المثلثية للزاوية $(360^\circ + 60^\circ)$ هي نفس قيمة الزاوية المثلثية (60°) لماذا ؟

ملاحظة: لقد سبق ان ذكرنا بانه اذا كان قياس الزاوية اكبر من 360° نطرح 360° أو مضاعفاتها من

هذا القياس الى يصبح القياس 60° هو القياس الرئيسي للزاوية ، وعليه فان $420^\circ - 360^\circ = 60^\circ$

$$\therefore \sin 420^\circ = \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\cos 420^\circ = \cos 60^\circ = 1/2$$

نشاط: اكمل قيم الدوال الدائرية الباقية للزاوية 420°

[4-7] قيم الدوال الدائرية للزاوية التي قياسها $(-\theta)$

أولاً: اذا كانت الزاوية التي قياسها (θ) تقع في الربع الاول فان الزاوية التي قياسها $(-\theta)$ تقع

في الربع الرابع


لاحظ الشكل (4-15)

إن الزاوية AOB التي قياسها (θ) نرمز لها بالرمز :

$$B(x,y) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

لكن $B \rightarrow B$ تحت تأثير انعكاس حول محور X

لذا فإن



الشكل (4-15)

$$B'(\cos(-\theta), \sin(-\theta))$$

ولكن : $x \rightarrow x$ ، $y \rightarrow -y$

لذا فإن

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

ويكون $\tan(-\theta) = \sin(-\theta) / \cos(-\theta)$

$$= -\sin \theta / \cos \theta$$

$$\boxed{\tan(-\theta) = -\tan(\theta)}$$

ملاحظة: يمكن اثبات النتيجة السابقة نفسها في حالة وقوع الزاوية التي قياسها

$(-\theta)$ في الاربع: الثاني أو الثالث أو الأول وبالطريقة السابقة نفسها.

مثال 10

جد $\cos(-240^\circ)$, $\sin(-240^\circ)$

الحل :

$$\sin(-240) = -\sin 240^\circ$$

$$= -\sin(180^\circ + 60^\circ)$$

$$= \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$, \cos(-240^\circ) = \cos(240^\circ)$$

$$= \cos(180^\circ + 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ = -1/2$$

جد $\tan(-300^\circ)$, $\cos 780^\circ$, $\sin(19\pi/2)$

مثال 11

الحل :

$$\sin(19\pi/2) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 8\pi\right)$$

$$= \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$= -1$$

$$\cos 780^\circ = \cos(2 \times 360 + 60^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ$$

$$= 1/2$$


$$\tan(-300^\circ) = -\tan 300^\circ$$

$$= -\tan(360 - 60)$$


$$= -(-\tan 60)$$

$$= \tan 60$$

$$= \sqrt{3}$$



الشكل (4-16)



تمارين (4-4)

1. إذا كان $\sin \theta = -8/17$ ، θ تقع في الربع الثالث فجد :
 $\cos \theta$ ، $\cos (3\Pi/2 - \theta)$ ، $\sin (\Pi/2 + \theta)$
2. إذا كان $\cos \beta = 0.8$ ، $270^\circ < \beta < 360^\circ$ فجد :
 $\sin \beta$ ، $\cos (270^\circ + \beta)$ ، $\cos (270^\circ - \beta)$
3. إذا كان $\sin \alpha = 24/25$ ، $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ فاحسب قيمة :
 $\sin (90^\circ - \alpha) - \cos (180^\circ - \alpha) + \cos 120^\circ$
4. أثبت أنه
 $\cos (\Pi/2 + \theta) \cos (\Pi/2 - \theta) - \sin (\Pi + \theta) \sin (\Pi - \theta) = 0$
5. حدد الربع الذي تقع فيه الزاوية α إذا كان :
 - a. $\sin \alpha > 0$ ، $\cos \alpha > 0$
 - b. $\sin \alpha > 0$ ، $\cos \alpha < 0$
 - c. $\sin \alpha < 0$ ، $\cos \alpha < 0$
 - d. $\sin \alpha < 0$ ، $\cos \alpha > 0$
6. أي العبارات الآتية صحيحة وأيها خاطئة ؟
 - a. $\sin 270^\circ = 2 \sin 30^\circ$
 - b. $\sin 90^\circ = 2 \cos 60^\circ$
 - c. $\cos 150^\circ = 1/2 \tan 120^\circ$
 - d. $\cos (30^\circ + 60^\circ) = \cos 30^\circ + \cos 60^\circ$
7. أثبت أن :
 - a. $\sin (90^\circ + \alpha) + \cot (270^\circ - \alpha) + \cos (180^\circ + \alpha) = \tan \alpha$
 - b. $\sin^2 135^\circ = 1/2 (1 - \cos 270^\circ)$

[4 - 8] رسم منحنيات الدوال المثلثية Graph of Trigonometric Functions


تمهيد:

كثير من الحوادث والظواهر الطبيعية تتكرر بشكل متماثل في فترات متساوية من الزمن، مثل:


1. رؤية وجه من اوجه القمر من على سطح الارض، فنحن نراه:

هلالاً ، تربيعاً أول ، بدرأ ، تربيعاً ثانياً ، محاق ، .


ثم يتكرر ذلك كل (29) يوماً و (12) ساعة و (44) دقيقة و (3) ثوانٍ.



2. دوران الارض حول الشمس يتكرر بصفة منتظمة كل فترة زمنية معلومة.



3. جميع حركات الموجات التي توصف بأنها كهرومغناطيسية مثل موجات الضوء، موجات الراديو، كذلك الموجات التي يبثها الرادار عند عمله، جميعها موجات مستعرضة وهي تتكرر في فترات زمنية متساوية.



وان رسم الدوال المثلثية هو من النوع الذي يتكرر في دورات محدودة وذلك لان هذه الدوال هي دوالاً دورية.

أولاً: رسم منحنى جيب الزاوية. ($y = \sin x$)


إذا تغير قياس الزاوية الموجهة بالوضع القياسي، تتغير قيمة الدالة الدائرية تبعاً لها. فمثلاً إذا تغير قياس الزاوية من 0° إلى 360° (أو من 0 إلى 2π) فإننا نحصل على قيم مختلفة لدالة الجيب لهذه الزاوية ضمن الفترة $[-1, 1]$.



فإذا كانت y تساوي قيمة الجيب وكانت الزاوية هي x فإن $y = \sin x$. وللتمثيل البياني لدالة الجيب ننشئ جدولاً يبين قيم x والقيم المناظرة لها y . كما في الجدول الآتي:

x	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	360°
		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$y = \sin x$	0	0.5	0.86	1	0.86	0.5	0	-0.5	-0.86	-1	-0.86	-0.5	0


نحدد الأزواج التي نحصل عليها من x, y ثم نرسم على ورقة المربعات منحنى الجيب ويكون كما في الشكل (17-4)



الشكل (4-17)

خواص منحنى الجيب. المجال $[0, 360^\circ]$:

1. يقطع منحنى الجيب محور السينات عند $x = 0^\circ$, $x = 180^\circ$, $x = 360^\circ$
 2. أكبر قيمة للجيب عند $x = 90^\circ$ وتساوي 1
 3. أصغر قيمة للجيب عند $x = 270^\circ$ وتساوي -1.
 4. عندما $x \in (0, 180^\circ)$ تكون قيمة $\sin x$ موجبة ويكون المنحنى واقعاً أعلى محور السينات.
 5. عندما $x \in (180^\circ, 360^\circ)$ يكون قيمة $\sin x$ سالبة ويكون المنحنى واقعاً أسفل محور السينات.
 6. لو رسمنا $y = \sin x$ في الفترة $[2\pi, 4\pi]$ نجد ان بيان \sin كرر نفسه. لاحظ الشكل
- (4 - 18)



الشكل (4-18)

مثل هذه الدالة نطلق عليها دالة دورية.
والفترة التي كرر فيها المنحني نفسه (2π) تسمى دورة الدالة.

ويسمى العدد: $\frac{1}{\text{دورة الدالة}}$ بالتردد ، ويسمى العدد $\frac{\text{أكبر قيمة} - \text{أقل قيمة}}{2}$ سعة الدالة.

أي أن: دورة الدالة $y = \sin x$ هي 2π

وان التردد $= \frac{1}{2\pi}$

وان السعة $= \frac{1 - (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$


مثال:

ارسم بيان الدالة $y = 4 \sin x$ ومن الرسم جد:

أ. الدورة ب. التردد ج. السعة

الحل: الجدول الآتي يوضح

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π	$\frac{7\pi}{2}$	4π
$\sin x$	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0
$4\sin x$	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0



دورة الدالة $y = 4 \sin x$ هي 2π

التردد $1/2\pi =$

السعة $4 = (4 - (-4))/2 =$

نشاط:


أ. ارسم بيان الدالة $y = \sin 2x$ وعين السعة والتردد والدورة.

ب. ارسم بيان الدالة $y = \sin 3x$ وعين السعة والتردد والدورة.

ثانياً: رسم بيان الدالة $y = \cos x$

الحل: نكون جدولاً يبين العلاقة بين x , $\cos x$ كما يأتي:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π	$\frac{7\pi}{2}$	4π
$\cos x$	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1



لو نظرنا الى البيان في الفترة $[0, 2\pi]$ وفي الفترة $[2\pi, 4\pi]$ نجدتهما متشابهان تماماً في الفترتين أي أن بيان \cos يكرر نفسه كل فترة طولها 2π وعلى ذلك فإن الدالة $y = \cos x$ دورية.

دورة الدالة $y = \cos x$ هي 2π

التردد $= \frac{1}{2\pi}$

السعة = 1

نشاط:

1. ارسم بيان الدالة $y = \cos \frac{1}{2} x$ في الفترة $[0, 4\pi]$ ومن الرسم عين دورة الدالة وترددتها وسعتها.

2. ارسم بيان الدالة $y = 2 \cos 4x$ في الفترة $[0, \pi]$ ومن الرسم عين كلاً من دورة الدالة وترددتها وسعتها.

خواص منحنى الجيب التمام ($y = \cos x$)

1. يقطع محور السينات عند $x = \frac{\pi}{2}$, $x = 3\frac{\pi}{2}$

2. اكبر قيمة لجيب التمام عند $x = 0$, $x = 2\pi$ تساوي 1


3. اصغر قيمة لجيب التمام عند $x = \pi$ تساوي -1

4. عندما تكون x من 0 الى $\frac{\pi}{2}$ يكون منحنى الجيب التمام موجباً، اذ يكون اعلى محور السينات وعندما تأخذ x القيم من $\frac{\pi}{2}$ الى $3\frac{\pi}{2}$ يكون منحنى الجيب تمام سالباً، اذ يكون اسفل محور السينات. وعندما تأخذ x القيم من $3\frac{\pi}{2}$ الى 2π يكون منحنى الجيب التمام موجباً اذ يكون اعلى محور السينات.

ثالثاً: رسم منحنى الظل: ($y = \tan x$)

نكون جدولاً يبين العلاقة بين x , $y = \tan x$

x	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	360°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
y=tan x	0	0.6	1.7	غير معرفة	-1.7	-0.6	0	0.6	1.7	غير معرفة	-1.7	-0.6	0



الدالة $y = \tan x$ دورية

ودورتها π

التردد $1/\pi$


المنحنى ليس محدود لا من اعلى ولا من اسفل لذا ليس له سعة

خواص منحنى الظل: $y = \tan x$

1. يقطع المحور السيني عند x تساوي: 0° , 180° , 360°
2. المنحنى غير متصل كما في منحنى الجيب ومنحنى الجيب تمام.
3. عندما تكون x بين 0° , 90° يكون الظل موجباً، وكلما اقتربنا من $x = 90^\circ$ نجد قيمة الظل تزداد ازدياداً كبيراً
4. عندما تكون بين 90° , 180° يكون الظل سالباً وعندما تقع x بين 180° , 270° يكون الظل موجباً
5. يكون سالباً عندما تقع x ما بين 270° , 360°

رابعاً: رسم منحنى ظل التمام: $y = \cot x$
 نكون جدولاً يبين العلاقة بين $\cot x$, x وكما يأتي:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
y=cotx	غير معرفة	1.7	1	0.6	0	-0.6	-1.7	غير معرفة	1.7	0.6	0	-0.6	-1.7	غير معرفة




خواص منحنى ظل التمام:

1. يقطع محور السينات عند $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$
2. المنحنى غير متصل.
3. عندما تكون x بين 0 و $\frac{\pi}{2}$ نجد ان ظل التمام موجب، وعندما تكون x ما بين $\frac{\pi}{2}$ و π نجد انه سالب وعندما تكون x ما بين π و $\frac{3\pi}{2}$ يصبح موجباً، وعندما تكون x ما بين $\frac{3\pi}{2}$ و 2π يكون سالباً.

خامساً: رسم منحنى قاطع الزاوية: $y = \sec x$

نكوّن جدولاً يبين العلاقة بين x , $y = \sec x$ كما يأتي:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$y = \sec x$	1	1.2	1.4	2	غير معرفة	-2	-1.2	-1	-1.2	-2	غير معرفة	2	1.2	1




خواص منحنى القاطع:

1. لا يقطع منحنى القاطع محور السينات على الإطلاق.
2. عندما x ما بين 0 و $\pi/2$ يكون المنحنى موجباً.
3. عندما x ما بين $\pi/2$ و $3\pi/2$ يكون المنحنى سالباً.
4. عندما x ما بين $3\pi/2$ و 2π يكون المنحنى موجباً.
5. المنحنى غير متصل.
6. المنحنى غير محدود لا من الأعلى ولا من الأسفل لذا ليس له سعة

سادساً: رسم منحنى قاطع التمام: $y = \csc x$

نكوّن جدولاً يبين العلاقة بين x , $y = \csc x$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
y=cscx	غير معرفة	2	1.4	1.2	1	1.2	2	غير معرفة	-2	-1.2	-1	-1.2	-2	غير معرفة



خواص منحنى قاطع التمام

1. المنحنى لا يقطع محور السينات.
2. عندما x ما بين 0 الى π يكون المنحنى موجبا اعلى محور السينات.
3. عندما x ما بين π الى 2π يكون المنحنى سالبا اسفل محور السينات.
4. المنحنى غير متصل.
5. دورة المنحنى 2π والتردد $\frac{1}{2}$.
6. المنحنى غير محدود لا من الاعلى ولا من الاسفل لذا ليس له سعة.

1. ارسم بيان كل من الدوال الآتية. ومن الرسم استنتج كلا من دورة الدالة وترددها وسعتها:

1. $y = \sin 3x$ on $[0, 4\pi/3]$
2. $y = -\sin x$ on $[0, 2\pi]$
3. $y = 3\sin 2x$ on $[0, 2\pi]$
4. $y = \cos 2x$ on $[-\pi, 2\pi]$
5. $y = -2\cos x$ on $[-2\pi, 2\pi]$
6. $y = 2 \cos 3x$ on $[0, 3\pi]$
7. $y = 2 \tan x$ on $[-\pi/2, 3\pi/2]$
8. $y = \tan 2x$ on $[0, \pi]$

2. اختبار موضوعي

1. ضع إشارة + أو - في المستطيلات التالية لتحصل على عبارة صحيحة :

- a. $\cos(20^\circ + 50^\circ) = \cos 20^\circ \cos 50^\circ \boxed{} \sin 20^\circ \sin 50^\circ$
- b. $\tan(3A - 2B) = \tan 3A \boxed{} \tan 2B / 1 \boxed{} \tan 3A \tan 2B$
- c. $\sin(80^\circ \boxed{} 10^\circ) = \sin 80^\circ \cos 10^\circ - \cos 80^\circ \sin 10^\circ$

2. اكمل ما يأتي لتحصل على عبارة صحيحة

- a. $\sin(40^\circ + 180^\circ) = \sin 40^\circ \boxed{} + \boxed{} \sin 180^\circ$
- b. $2\sin \pi/3 \cos \pi/3 = \sin \boxed{}$
- c. $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ = \cos \boxed{}$

3. عيّن العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة فيما يأتي:

- a. $\sin 6x = 2 \sin 3x$
- b. $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin 30^\circ$
- c. $\cos 80^\circ = \cos^2 40^\circ - \sin^2 40^\circ$
- d. \emptyset هي مجموعة حل المعادلة $2\cos x + 3 = 0$

4. اختر من القائمة A ما يناسبها من القائمة B

القائمة A

1. $\cos 4A \cos A - \sin 4A \sin A =$
2. $\sin A \cos 4A - \sin 4A \cos A =$
3. $\sin 4A \cos A + \cos 4A \sin A =$

القائمة B

- a. $\sin 5A$
- b. $\cos 5A$
- c. $\sin 3A$
- d. $\sin (-3A)$

5. اختبار مقالي

1. إذا كان $2\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ وكانت $\cos x = \frac{2}{3}$ فاوجد قيمة كل من $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$

2. إذا كان $2\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ وكانت $\cos x = \frac{3}{5}$ فاوجد قيمة كل من $\cos 2x$, $\sin 2x$, $\tan 2x$.

3. بدون استخدام الحاسبة اوجد قيمة:

a. $\sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8}$

b. $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12}$

4. اثبت صحة المتطابقة الآتية:

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$$

Chapter 5

الغاية والاستمرارية Limit and Continuity

[5-1] جوار العدد

[5-2] غاية الدالة

[5-3] غاية الدوال الدائرية

[5-4] الاستمرارية

المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
غاية الدالة $f(x)$ عندما $x \rightarrow a$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
إستمراية $f(x)$ عند $x = b$	$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$


الفصل الخامس

الغاية والاستمرارية

limit and continuity غاية الدالة واستمراريتها

تمهيد :

إذا نظرنا في الشكل (5-1) نلاحظ نقطتين الأولى a تقع على يسار العدد 3 والآخرى b تقع على



يمين العدد 3

فإذا فرضنا ان a تأخذ قيماً متزايدة

شكل (5-1)

$2.9, 2.99, \dots, 2.999, \dots$

تتقارب باستمرار نحو العدد 3 من اليسار ونرمز لذلك بالرمز a نقول ان

$$a \rightarrow 3$$

وإذا اعطينا b قيماً متناقصة مثل :

$3.1, 3.01, 3.001, \dots, 3.000001, \dots$

نقول ان b تتقارب باستمرار نحو العدد 3 من اليمين ونرمز لذلك بالرمز

$$b \rightarrow 3$$

[5-1] جوار العدد neighbourhood

على ضوء ما سبق يمكنك ان تتفهم التعريف الآتي :

إذا كان a عدداً (نقطة) وكان \in (تقرأ إبسلون) عدداً موجباً تسمى الفترة

1 - $(a - \in, a + \in)$ جواراً للعدد a (الجوار هنا يحوي a)

2 - $(a - \in, a]$ جواراً أيسر للعدد a (الجوار هنا يحوي a)

3 - $[a, a + \in)$ جواراً أيمن للعدد a (الجوار هنا يحوي a)

ويرمز لمجموعة الجوار بالرمز N

فمثلاً

إذا كان $a = 1, \in = 1/2$ فان

$$1. \quad (1 - \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}) \text{ جواراً للعدد } 1$$


2. $\left(1 - \frac{1}{2}, 1\right]$ جواراً يسر للعدد 1

3. $\left[1, 1 + \frac{1}{2}\right)$ جواراً أيمن للعدد 1

[5-2] غاية الدالة (limit of a function)

تمهيد توضيحي :

سنعطي فيما يأتي توضيحاً هندسياً اي باستخدام الرسم فقط للتعريف بمفهوم الغاية إذ سنكتفي بأدراك أولي للتعريف عن طريق الحواس ثم ننتقل بعد ذلك الى التعريف المحدد ففي الشكل (5-2)



الشكل (5-2)

نلاحظ ان هناك بياناً للدالة f (منفصلة هندسياً) عندما $x=3$ كما يمكنك ان تلاحظ ان $y = f(x)$ تأخذ قيمةً متقاربة من 4 وذلك عندما تتقارب x من 3 من اليسار وكلما اردنا ان نجعل $f(x)$ اكثر قرباً الى 4 فانه يمكننا ذلك عن طريق اعطاء x قيمةً اكثر قرباً الى 3 من اليسار وفي هذه الحالة تقول :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 4 \quad \text{أن}$$

وتقرأ غاية الدالة عند 3 من اليسار تساوي 4

لاحظ :


اننا لم نتعرض لذكر ما اذا كانت الدالة معرفة او ليست معرفة عند $x = 3$ كما يمكنك ان تلاحظ $f(x)$ تتقارب من 5 كلما اقتربت x الى 3 من جهة اليمين وفي مثل هذه الحالة نقول ايضاً :

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 5 \quad \text{غاية الدالة تساوي 5 عندما}$$

تتقارب x الى 3 من اليمين وتقرأ غاية الدالة عند 3 من اليمين تساوي 5

لاحظ اننا لم نذكر فيما اذا كانت الدالة معرفة او ليست معرفة عند $x = 3$

الشكل (3-5)



ملاحظة :

الدالة تتقارب من 9 عندما تتقارب x من 4 من اليسار واليمين او $f(x)$ تتقارب من 9 عندما تتقارب x من 4 وهذا يعني

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 9$$


وفي هذه الحالة عندما تتساوى النهايتان لدالة مثل f عند نقطة مثل 4 من اليسار واليمين نقول ان للدالة f غاية عند 4 ونعبر عن ذلك بالصورة الرمزية .

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 9$$

الغاية عند $x \rightarrow a$

اعتماداً على ما عرضناه سابقاً في تقديم مفهوم الغاية باستخدام الرسوم التوضيحية كما في

الشكل (4-5) وقلنا بأن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$



شكل (4-5)

تفهم من هذا عموماً انه :

بأمكننا دوماً ان نجعل $f(x)$ قريبة من L بقدر ما نشاء وذلك بأعطاء x قيمة قريبة من a من اليسار بصورة مناسبة .

فإذا اردنا اعطاء صيغة رياضية كهذا الفهم العام فهذا سيكون على النحو الاتي :

1. إذا حددنا اي معيار للقرب من L مثل $\epsilon > 0$

2. يمكننا تحديد جوار ايسر N_1 للعدد a مثلاً $(a-h, a)$

حيث h عدد حقيقي موجب بحيث $h \leq \epsilon$:

عندما

$$x \in N / \{a\} \Rightarrow$$

$f(x)$ تكون قريبة من L حسب المعيار ϵ

$$x \in N / \{a\} \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

ومنه نتوصل الى التعريف الاتي :

تعريف [5-2-1]

إذا قلنا $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ فهذا يعني $\forall \epsilon > 0$

يوجد جوار ايسر N_1 للنقطة (العدد) a

$$x \in N_1 / \{a\} \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

يمكنك ان تلاحظ بأنه لأثبت $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = L$ لابد من ايجاد الخطوات الآتية :

1. حدد مجال الدالة

2. تأكد في ضوء تحديدك لمجال الدالة فيما اذا كانت f معرفة من يسار (a) بمعنى معرف على

الفترة :

$$N / \{a\} = (a-h, a)$$

لاحظ اننا لا نشترط ان الدالة معرفة عند a

3. اختر $\epsilon > 0$

4. ضع $|f(x) - L| < \epsilon$ ثم باشر بحل المتباينة السابقة فاذا استطعت ان تحدد جوراً ايسر

مثل N للعدد a بحيث :

عندما تكون :

$$x \in N / \{a\}$$

$$|f(x) - L| < \epsilon \quad \text{فإن}$$

تكون صحيحة وبذلك تكون قد اثبت صحة المطلوب منك .

مثال

ليكن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ اثبت ان $f(x) = 2x - 1$

الحل :

باستخدام التعريف

1. مجال $R = f$

2. بما ان f معرفة على R فهي معرفة في يسار 2 اي ان f معرفة على اية فترة

مثل $(2-h, 2)$

3. لتكن $\epsilon > 0$

$$4. |f(x) - 3| < \epsilon$$

$$|2x-1-3| < \epsilon$$

$$|2x-4| < \epsilon$$

$$-\epsilon < 2x-4 < \epsilon$$

$$4 - \epsilon < 2x < 4 + \epsilon$$

$$2 - \frac{\epsilon}{2} < x < 2 + \frac{\epsilon}{2}$$

وهذا يعني اذا كانت :

$$x \in (2 - \frac{\epsilon}{2}, 2 + \frac{\epsilon}{2}) \Rightarrow |f(x) - 3| < \epsilon$$

تكون صحيحة :

$$(2 - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{2}, 2 + \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{2}) = (2 - \epsilon, 2)$$

فنجد ان

$$\text{اذا كانت } x \in N/\{2\} \Rightarrow |f(x) - 3| < \epsilon \text{ تكون صحيحة}$$

∴ الغاية المعطاة صحيحة

وبنفس الطريقة غاية الدالة عندما $x \rightarrow a$ من اليمين

[2-2-5] تعريف

إذا قلنا بأن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ فهذا يعني $\forall \epsilon > 0$ يوجد جوار N للنقطة a

$$x \in N/\{a\} \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

من الواضح بأنه إذا كانت :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

وهذا يعني ان :

1 وجود الغاية عند النقطة a يؤدي الى وجود غاية من اليسار وغاية من اليمين عند a كلتاهما متساويتان .

2 إذا وجدت غاية عند النقطة a من اليمين وغاية عند a من اليسار وكان : $L_1 \neq L_2$ فان الغاية عند a ليست موجودة أو لا تكون معرفة .

[3-2-5] بعض مبرهنات الغاية

فيما يأتي مجموعة من المبرهنات التي تساعد في حساب الغاية ويمكن اثبات صحتها باستخدام تعريف الغاية وكما في الامثلة السابقة ، ولكننا سنكتفي بذكر منطوق هذه المبرهنات ونستخدمها في حل امثلة واسئلة للغاية في هذه المرحلة من الدراسة .

مبرهنة (1)

إذا كان N جوار للعدد a وكانت الدالة معرفة $\forall x \in N/\{a\}$ وكانت $f(x) = C$ حيث $C \in \mathbb{R}$ ، ثابت فان $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = C$

مثلاً

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{5} = \sqrt{5} , \quad \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

مبرهنة (2)

إذا كان N جوار للعدد a وكانت الدالة $f(x) = x$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

مثلا

$$\lim_{x \rightarrow 2} x = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 3} x = 3$$

مبرهنة (3)

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجودة ، $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ موجودة

فإن

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \mp g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \mp \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [c f(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) / g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) / \lim_{x \rightarrow a} g(x), [\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0]$

مثال 1

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} (x+2) &= \lim_{x \rightarrow 3} x + \lim_{x \rightarrow 3} 2 \\ &= 3 + 2 = 5 \end{aligned}$$

مثال 2

a. $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = [\lim_{x \rightarrow a} x]^2 = a^2$

b. $\lim_{x \rightarrow 2} (x+3)^3 = [\lim_{x \rightarrow 2} (x+3)]^3$

$$= [\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 3]^3$$

$$= [2 + 3]^3$$

$$= 125$$

مثال 3

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x) &= \lim_{x \rightarrow -1} x^2 + \lim_{x \rightarrow -1} 3x \\ &= (-1)^2 + (3(-1)) \\ &= 1 - 3 = -2\end{aligned}$$

مثال 4

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - 4}{x - 1}$$



$$= \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (2x^2 - 4)}{\lim_{x \rightarrow -2} (x - 1)}$$

$$\frac{2(-2)^2 - 4}{-2 - 1} = \frac{8 - 4}{-3} = \frac{-4}{3}$$

مثال 5

لكن $f(x) = |x-1| / x-1$, $x \neq 1$ جد ان امكن .

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$f(x) = \begin{cases} x-1 / x-1 = 1 & , x > 1 \\ -(x-1) / x-1 = -1 & , x < 1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} 1 = 1 = L_1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} -1 = -1 = L_2\end{aligned}\right\}$$

$\therefore L_1 \neq L_2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غير موجودة

مثال 6

لتكن

$$f(x) = \begin{cases} x^2+4 & , x \geq 1 \\ 5x & , x < 1 \end{cases}$$

جد .

1. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

الحل :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+4) = 4+4 = 8$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+4) = 1+4 = 5 = L_1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (5x) = 5 \times 1 = 5 = L_2 \end{cases}$

$\therefore L_1 = L_2 \iff \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ الغاية موجودة

مثال 7

جد :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^2+ax+a^2)}{x-a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} (x^2 + ax + a^2)$$

$$= a^2 + a^2 + a^2 = 3a^2$$

جد :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{(x - a)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})}{(x - a)} \times \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{(\sqrt{x} + \sqrt{a})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

لتكن

$$f(x) = \begin{cases} bx^2 + 3 & , x \leq 2 \\ c - 2x & , x > 2 \end{cases}$$

إذا كانت

إذا كانت

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 11$ جد قيمة $b, c \in \mathbb{R}$

الحل :

موجودة $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 11$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (c - 2x) = c - 4 \Rightarrow c - 4 = 11 \Rightarrow c = 15$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (bx^2 + 3) = 4b + 3 \Rightarrow 4b + 3 = 11 \Rightarrow b = 2$$

[5-3] غاية الدوال الدائرية limit of circular function

لقد تعلمت ان الدوال الكثيرة الحدود مستمرة عند اية نقطة من نقاط مجالها في هذا البند سنتناول دراسة غايات ومشتقات الدوال الدائرية ونبدأ بايجاد

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x$$

مبرهنة (1) :

حيث x بالقياس الدائري

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$$

البرهان :

$$cb < cd \text{ طول القوس } < dh$$

$$\Rightarrow \sin x < x < \tan x$$

$$\Rightarrow 1/\sin x > 1/x > \cos x / \sin x$$


$$\Rightarrow 1 > \sin x / x > \cos x$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} 1 > \lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x > \lim_{x \rightarrow 0} \cos x$$

$$\Rightarrow 1 > \lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x > 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$$

بضرب طرفي التراجحة بـ $(\sin x)$



الشكل (5-5)

مبرهنتات غايات الدوال الدائرية

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \sin ax / ax = 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \tan ax / ax = 1$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

مثال 1

جد :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin 3x / 4x$$

الحل :

$$= 1/4 \lim_{x \rightarrow 0} \sin 3x / x$$

$$= 3 / 4 \lim_{x \rightarrow 0} \sin 3x / 3x = 3/4 \times 1 = 3/4$$

مثال 2

جد :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{x \tan 2x}$$

الحل :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 4x}{x^2}}{\frac{x \tan 2x}{x^2}}$$

$$= \frac{4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x}}{2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{2x}}$$

$$= \frac{4 \times 1 \times 4 \times 1}{2 \times 1} = 8$$

مثال 3

جد :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x + \tan 3x}{\sin 5x}$$

الحل :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan 4x}{x} + \frac{\tan 3x}{x}}{\frac{\sin 5x}{x}}$$

بقسمة البسط والمقام على (x)

$$= \frac{4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{4x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{3x}}{5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x}}$$

$$= \frac{(4 \times 1 + 3 \times 1)}{5 \times 1} = \frac{4 + 3}{5} = \frac{7}{5}$$

مثال 4

الحل :


$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sqrt{\cos 2x})/x^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} \right) \times \left(\frac{1 + \sqrt{\cos 2x}}{1 + \sqrt{\cos 2x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos 2x)}{x^2 (1 + \sqrt{\cos 2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2 (1 + \sqrt{\cos 2x})}$$

$$= 2 \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sqrt{\cos 2x})} = 2 \frac{1 \times 1}{1 + 1} = 1$$



تمارين (5-1)

1. جد الغاية لكل مما يأتي:

a. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - x - 6)}{(x - 3)}$

c. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 1)}{(2x - 2)}$

b. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 4)$

e. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}$

d. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{\sqrt{x+5} - 3}$, $\{x: x \geq -5\} \setminus \{4\}$

2. إذا كان $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

جد $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ حيث $f(x) = |x-1|$

3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} 5 - x^2 & \text{إذا كانت } x > -1 \\ x^2 + 3 & \text{إذا كانت } x < -1 \\ 4 & \text{إذا كانت } x = -1 \end{cases}$$

إذا كانت $x > -1$

إذا كانت $x < -1$

إذا كانت $x = -1$

أ. ارسم المخطط البياني لهذه الدالة

ب. هل للدالة غاية عند -1 بين ذلك ؟

ج. جد $\lim_{x \rightarrow -1/2} f(x)$

4.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{إذا كانت } x > -1 \\ 6 & \text{إذا كانت } x = -1 \\ 4x + b & \text{إذا كانت } x < -1 \end{cases}$$

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 3$ جد قيمة $a, b \in \mathbb{R}$

5. إذا كان $g(x) = 3x^2 + 2x - 3$

$f(x) = x^2 + 6$

جد $\lim_{x \rightarrow 0} (g/f)(x)$

$\lim_{x \rightarrow 0} (g \cdot f)(x)$

6. جد الغاية لكل مما يأتي :

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x^2}{\sin^2 x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin 2x + \frac{\tan 4x}{6x} \right]$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3x}{\sin 2x} + \frac{1 - \cos 6x}{\sin^2 x} \right]$

[5-4] الاستمرارية continuity

تكون الدالة مستمرة عند $x = b$ اذا حققت الشروط الثلاث التالية :

1. معرفة $f(b)$
2. $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ موجودة
3. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$

تعريف:

يقال للدالة f مستمرة اذا كانت مستمرة في جميع عناصر مجالها .

مثال 1

اذا كانت $f(x) = 8 - x^3 - 2x^2$ اثبت ان الدالة مستمرة .

الحل:

$$\forall b \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b} f(x) &= \lim_{x \rightarrow b} (8 - x^3 - 2x^2) \\ &= 8 - b^3 - 2b^2 \end{aligned}$$

$$f(b) = 8 - b^3 - 2b^2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$$

\therefore الدالة مستمرة عند $x = b$ لكن b تمثل كل عنصر من عناصر المجال

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ مستمرة } f(x)$$

$\therefore f(x)$ مستمرة

مثال 2

نلاحظ من الشكل المجاور:

1. الدالة غير معرفة عند $x = 0$

\Leftarrow الدالة غير مستمرة عند $x = 0$


2. $f(1) = 6$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$$

\therefore الدالة غير مستمرة عند $x = 1$

3. $\lim_{x \rightarrow +3} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

\therefore الدالة غير مستمرة عند $x = 3$



[5-4-1] تعريف:

يقال للدالة f مستمرة عن يسار b اذا كانت معرفة عن يسار b , اذا حققت :

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

[5-4-2] تعريف:

يقال للدالة f مستمرة عن يمين b اذا كانت معرفة عن يمين b , اذا حققت :

$$\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$$

[5-4-3] تعريف:

يقال للدالة f مستمرة على الفترة المغلقة $[a, b]$ اذا حققت ما يأتي :

1. الدالة مستمرة على الفترة المفتوحة (a, b) .

2. الدالة مستمرة عن يمين a وعن يسار b .

مثال 3

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , x \geq 2 \\ 8 - x & , x < 2 \end{cases}$$

اثبت ان الدالة مستمرة على \mathbb{R} .

1. نثبت ان الدالة مستمرة عند $x = 2$

$$f(2) = (2)^2 + 2 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 2) = 4 + 2 = 6 = L_1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} (8 - x) = 8 - 2 = 6 = L_2 \end{cases}$$

$$\therefore L_1 = L_2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$\therefore f$ مستمرة عند $x = 2$.

$$\forall a > 2 \quad (2)$$

$$f(a) = a^2 + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (x^2 + 2) = a^2 + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

∴ الدالة مستمرة عند $x = a$

∴ الدالة مستمرة $\forall x > 2$

$$\forall a < 2 \quad (3)$$

$$f(a) = 8 - a$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (8 - x) = 8 - a$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

∴ الدالة مستمرة عند $x = a$

∴ الدالة مستمرة $\forall x < 2$

الدالة مستمرة عند $x = 2$ ، عند $x > 2$ ، عند $x < 2$

∴ الدالة مستمرة في \mathbb{R}

مثال 4 أثبت ان الدالة $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ مستمرة على الفترة المغلقة $[-1, 1]$.

الحل :

(1) واضح أن الدالة f مستمرة على الفترة المفتوحة $(-1, 1)$ وذلك لأنها مستمرة في كل نقطة من نقاط هذه الفترة .

فمثلاً لو اخذنا $x = 0$ فإن :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{1 - x^2} = 1 = f(0)$$

(2) الدالة f مستمرة عن يسار النقطة $x = 1$ وذلك لأن

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1 - x^2} = 0 = f(1)$$

(3) الدالة f مستمرة عن يمين النقطة $x = -1$ وذلك لأن :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt{1 - x^2} = 0 = f(-1)$$

اذن تكون الدالة f مستمرة على الفترة المغلقة $[-1, 1]$.

تمارين (5-2)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} 6 - x^2 & , x \geq 1 \\ 4x + 1 & , x < 1 \end{cases}$$

ابحث استمرارية الدالة عند $x = -1$, $x = 1$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & , x \neq 2 \\ 3 & , x = 2 \end{cases}$$

ابحث استمرارية الدالة عند $x = 2$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = |2x - 6|$$

ابحث استمرارية الدالة على \mathbb{R} .

إذا كان

لتكن

$$f(x) = \begin{cases} 5 - x^2 & , x < \sqrt{2} \\ x^2 + 1 & , x > \sqrt{2} \\ 4 & , x = \sqrt{2} \end{cases}$$

ابحث استمرارية الدالة عند $x = \sqrt{2}$, $x = -1$

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 9}$$

لتكن

ابحث استمرارية الدالة عند $x = 1$, $x = -3$, $x = 3$

إذا كانت الدالة مستمرة عند $x = 1$, $f(-1) = 5$ جد قيمة $a, b \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} 2a + x^2 & , x \geq 1 \\ 2x + b & , x < 1 \end{cases}$$

Chapter 6

المشتقات The Derivative

* نبذة تاريخية

* [6-1] التفسير الهندسي للمشتقة .

* [6-2] تطبيقات فيزيائية على المشتقة .

* [6-3] قواعد المشتقة .

* [6-4] قاعدة السلسلة .

* [6-5] معادلة المماس للمنحني والعمود على المماس .

* [6-6] الاشتقاق الضمني .

* [6-7] مشتقات الدوال الدائرية .


المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
مشتقة الدالة $f(x)$	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
السرعة	$V(t) = \frac{ds}{dt}$
التعجيل	$g(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$
قاعدة السلسلة	$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \cdot \frac{dn}{dx}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \div \frac{dx}{dn}$
تركيب الدالتين $f(x)$, $g(x)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$

المشتقات The Derivative

نبذة تاريخية :

إن أهم الاكتشافات الرياضية في القرن السابع عشر هي اكتشاف حساب التفاضل والتكامل من قبل اسحق نيوتن وكوتفريد وليم ليبنتز الذي بهذا الاكتشاف وصلت الرياضيات الى مستوى متقدم ، ويكون عندها انتهاء تاريخ الرياضيات الاولى بصورة رئيسة. وقد ظهرت في البداية فكرة التكامل وذلك مع ايجاد مساحات مناطق وحجوم اجسام واطوال اقواس معينة ، ثم وجد التفاضل بعد فترة من علاقات المسائل على مماسات لمنحنيات، ومع اسئلة حول القيم العظمى والصغرى للدوال. وقد لوحظ اخيراً بأن هناك علاقة بين التكامل والتفاضل وانهما عمليتان عكسيتان.

وسنتناول في هذا الفصل مفهوم "الإشتقاق" من مسألتين شغلنا اهتمام الرياضيين الاوائل في القرن السابع عشر ومنهم العالم الالماني ليبنتز الذي نشر بحثاً وذلك في سنة 1684 للميلاد ، تطرق فيه الى مفهوم مشتقة الدالة، وقد عرفها بميل المستقيم (غير الموازي للمحور الشاقولي) اي ان المسألة الأولى التي سنتناولها تتعلق بالمماس للمنحني عند نقطة عليه. والمسألة الثانية فهي فيزيائية تتعلق بحركة جسم في خط مستقيم.



الشكل (1-6)

[6-1] التفسير الهندسي للمشتقة

لتكن $a(x_1, y_1)$ و $b(x_2, y_2)$ من نقط الدالة f

ليكن \overleftrightarrow{ab} قاطعاً لمنحني الدالة في (a) و (b)

\overleftrightarrow{ab} يصنع زاوية قياسها θ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

$$M = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \overleftrightarrow{ab} \text{ ميل} = \tan \theta$$

في Δabn القائم في n

$$cd = an$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 = an$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = bn$$

$$m \propto bn = m \propto bmc$$

$$y_2 = f(x_2) \quad , \quad y_1 = f(x_1)$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$


$$x_2 = x_1 + \Delta x$$

$$\tan \theta = \overleftrightarrow{ab} \text{ ميل} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

إذا تصورنا بأن نقطة b (أخذت بالاقتراب) قريباً كافياً من النقطة a لوجدنا Δx اخذت تتقارب من عدد صغير جداً جداً حتى كادت أن تكون b هي a فإن $\Delta x \rightarrow 0$

فيقال لمثل هذه الحالة بأنها الغاية للدالة $\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ عندما $\Delta x \rightarrow 0$

أو بتعبير رياضي : $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$



الشكل (6-2)


أن هذه الغاية إن وجدت فهي تمثل المشتقة عند النقطة (x_1, y_1) وهي تساوي ميل المماس عند النقطة ويعبر عنها بأحدى التعابير الآتية :

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx}$$

يصح لنا القول ان المشتقة عند نقطة التماس تساوي ميل (Slope) المماس عندها .

ملاحظة :

التماس في المنحنيات يختلف عن مفهوم التماس في الدوائر. كما في الشكل (6-3)



الشكل (6-3)

مثال 1

إذا كان

$$f(x) = x^2 + 5x + 3$$

جد $f'(2)$ مستخدماً التعريف

الحل :

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta x)^2 + 5(2 + \Delta x) + 3 - 17}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2 + 10 + 5\Delta x - 14}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{9\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$\therefore f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x (9 + \Delta x)}{\Delta x} = 9$$

مثال 2

$$f(x) = \sqrt{x + 3} \quad x \geq -3$$

جد : $f'(1)$ باستخدام التعريف .

$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\Delta x + 3} - 2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+\Delta x} - 2}{\Delta x} \times \frac{\sqrt{4+\Delta x} + 2}{\sqrt{4+\Delta x} + 2}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4+\Delta x - 4}{\Delta x (\sqrt{4+\Delta x} + 2)}$$

$$\therefore f'(1) = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$$

مثال 3

$$f(x) = \frac{3}{x} \quad x \neq 0 \quad \text{جد } f'(x) \text{ باستخدام التعريف .}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{x+\Delta x} - \frac{3}{x}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x - 3(x+\Delta x)}{x(x+\Delta x)}}{\Delta x}$$


$$\therefore f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{3x - 3x - 3\Delta x}{x(x+\Delta x)} \times \frac{1}{\Delta x} \right) = \frac{-3}{x(x+0)} = \frac{-3}{x^2}$$

[2-6] تطبيقات فيزيائية على المشتقة

$S(t) = P(t)$ = البعد عن موقع بداية الحركة = الإزاحة (Displacement)

$V(t) =$ (Velocity) السرعة

$g(t) =$ (Acceleration) التعجيل



∴ مشتقة الإزاحة = السرعة

مشتقة السرعة = التعجيل

مثال 1

جسم يتحرك على خط مستقيم وفقاً للقاعدة

$$S = p(t) = 3t^2 + 5t + 8$$

حيث $p(t)$ الازاحة بالامتار والزمن t بالثواني ، جد سرعة الجسم الانية باستخدام التعريف .

$$\begin{aligned} V(t) = \dot{p}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p(t+\Delta t) - p(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{3(t+\Delta t)^2 + 5(t+\Delta t) + 8 - (3t^2 + 5t + 8)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{3t^2 + 6t\Delta t + 3(\Delta t)^2 + 5t + 5\Delta t + 8 - 3t^2 - 5t - 8}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta t (6t + 3\Delta t + 5)}{\Delta t} = 6t + 5 \quad \text{السرعة الانية م/ثا} \end{aligned}$$

مثال 2

لتكن $v(t)$ سرعة جسم بالامتار على الثواني حيث : $v(t) = 3t^2 - 12t + 50$

جد : 1. سرعة الجسم في نهاية 3 ثواني الاولى من بدأ الحركة .

2. جد السرعة عندما التعجيل = صفر

الحل :

1.

$$v(3) = 3(3)^2 - 12(3) + 50$$

$$= 27 - 36 + 50$$

$$= 41 \quad \text{السرعة في نهاية 3 ثواني الاولى م / ثا}$$

$$\begin{aligned}
 v'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{3(t + \Delta t)^2 - 12(t + \Delta t) + 50 - (3t^2 - 12t + 50)}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{6t \Delta t + 3(\Delta t)^2 - 12 \Delta t}{\Delta t} \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (6t + 3 \Delta t - 12) \\
 &= 6t - 12 = 0
 \end{aligned}$$



$$t = 2 \text{ ث}$$

$$\begin{aligned}
 v(2) &= 3(2)^2 - 12(2) + 50 \\
 &= 12 - 24 + 50 \\
 &= 38 \text{ م/ثا} \quad \text{السرعة عندما التّعجيل = صفر}
 \end{aligned}$$

ملاحظة :

يقال للدالة $f(x)$ قابلة للاشتقاق (Differentiable Function) عند x_1 إذا أمكن إيجاد $f'(x_1)$ ويمكن القول إذا وجد مماس وحيد للمنحني عند $x = x_1$ تكون الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = x_1$. وتكون الدالة قابلة للاشتقاق إذا كانت قابلة للاشتقاق من جميع عناصر مجالها.


يمكن أن يصاغ التعريف : الدالة $f(x)$ قابلة للاشتقاق عند النقطة

الدالة $f(x)$ قابلة للاشتقاق عند النقطة $x_1 \in (a, b)$ إذا تحقق الشرطان الآتيان :

(1) الدالة مستمرة في $[a, b]$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \quad (2) \text{ النهاية موجودة}$$

يمكن معرفة قابلية الاشتقاق من التمثيل البياني لدالة وكما في الاشكال الآتية :



الشكل (6-4)

في الاشكال الاربعة اعلاه:

شكل (a): الدالة قابلة للاشتقاق لانها مستمرة ولا تحوي حافات حادة واي مماس يرسم للمنحني في اية نقطة لا يوازي محور الصادات .

شكل (b): الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الصفر لوجود حافة حادة.

شكل (c): الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الصفر لان المماس عند $x = 0$ رغم انه وحيد لكنه يوازي محور الصادات فلا ميل له .

شكل (d): الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الصفر لانها غير مستمرة عند $x = 0$.

مثال 1

لتكن

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{إذا كانت } x \leq 1 \\ 2x + 2 & \text{إذا كانت } x > 1 \end{cases}$$


1 ارسم المخطط البياني للدالة f ، اثبت انها مستمرة عند $x = 1$

2 هل الدالة f قابلة للاشتقاق بين ذلك ؟

الحل :

$$x \leq 1 \quad y = f(x) = x^2 + 3 \quad 1$$

x	y
1	4
0	3
-1	4



$$y = 2x+2 \quad x > 1$$

	x	y
فجوة	1	4
	2	6

برهنة f مستمرة عند (1)

$$f(1) = 1^2+3=4$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+3) = 4 = L_1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (2x+2) = 4 = L_2 \end{array} \right.$$

$$\therefore L_1 = L_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \quad \text{موجودة}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \therefore$$

f مستمرة عند x=1

$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x}$$

a. عندما $x \rightarrow +1$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1+\Delta x) + 2 - 4}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 + 2\Delta x - 2}{\Delta x} = 2 = L_1$$

b. عندما $x \rightarrow -1$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta x)^2 + 3 - 4}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 + 2 \Delta x + (\Delta x)^2 - 1}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2 + \Delta x)}{\Delta x} = 2 = L_2$$

$$L_1 = L_2$$

$\therefore f$ قابلة للاشتقاق عند $x = 1$

c. عندما $x < 1$

$\forall a < 1$

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a + \Delta x)^2 + 3 - (a^2 + 3)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 + 3 - a^2 - 3}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x (2a + \Delta x)}{\Delta x}$$

$$f'(a) = 2a$$

f قابلة للاشتقاق عند $x=a$

f قابلة للاشتقاق ، $\forall x < 1$

عندما $x > 1$ ، $\forall a > 1$

$$f(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(a + \Delta x) + 2 - (2a + 2)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2a + 2\Delta x + 2 - 2a - 2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x} \Rightarrow f'(a) = 2$$

الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = a$

الدالة قابلة للاشتقاق $\forall x > 1$ (الدالة قابلة للاشتقاق $\forall x > 1$)

برهنا f قابلة للاشتقاق عند $x = 1$ ، $\forall x < 1$ ، $\forall x > 1$

$\therefore f$ قابلة للاشتقاق .

مثال 2

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{إذا كانت } x \geq 2 \\ 4x - 1 & \text{إذا كانت } x < 2 \end{cases}$$

1. هل الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = 2$

2. هل الدالة مستمرة عند $x = 2$ ؟

الحل :

1

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

$$\text{a. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta x)^2 + 3 - (4 + 3)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2 + 3 - 7}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(4 + \Delta x)}{\Delta x} = 4 = L_1$$

$$\text{b. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4(2 + \Delta x) - 1 - 7}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{8 + 4\Delta x - 8}{\Delta x} = 4 = L_2$$

$$\therefore L_1 = L_2$$

∴ الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = 2$

∴ الدالة مستمرة عند $x = 2$ (إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق عند نقطة فإنها مستمرة في تلك النقطة)

لكن العكس غير صحيح كما في المثال الاتي :

مثال 3

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = |x - 3|$$

1. برهن على أن الدالة مستمرة عند $x = 3$
2. هل الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = 3$ ؟

الحل :

1.

$$f(x) = \begin{cases} x - 3 & , x \geq 3 \\ 3 - x & , x < 3 \end{cases}$$

$$f(3) = 3 - 3 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3} (x - 3) = 3 - 3 = 0 = L_1 \\ \lim_{x \rightarrow 3} (3 - x) = 3 - 3 = 0 = L_2 \end{cases}$$

$$\therefore L_1 = L_2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0 \quad \text{موجودة}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

\therefore الدالة مستمرة عند $x = 3$

2.

$$f'(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 + \Delta x) - f(3)}{\Delta x}$$

$$\text{a. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3 + \Delta x - 3 - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 = L_1$$

$$\text{b. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3 - (3 + \Delta x) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 = L_2$$

$$\therefore L_1 \neq L_2$$

الدالة غير قابلة للاشتقاق عند $x=3$

من المثالين السابقين يمكن استنتاج المبرهنة الآتية والتي سنقبلها بدون برهان .

مبرهنة :

إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق عند $x = a$ ، فإن الدالة مستمرة عند $x = a$

الرموز المستخدمة في المشتقة :

لتكن $Y = f(x)$

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (f(x)) = \text{المشتقة الاولى}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \text{ميل المماس}$$

لمنحني الدالة عند أي نقطة (x, y) من نقطه .

1. لتكن $f(x)=c$ ، $c \in \mathbb{R}$ دالة ثابتة .

$$\frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{فإن } f'(x)=0 \quad \text{أي أن}$$

مثال 1

جد $f'(x)$

$$f(x) = 5 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f(x) = \sqrt{2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

2. لتكن $f(x)=x^n$

حيث $n \in \mathbb{R}$ ، $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$f'(x) = nx^{n-1} \quad \text{فإن}$$

مثال 2

جد $f'(x)$

$$1. \quad f(x)=x^6 \\ \therefore f'(x)=6x^5$$

$$2. \quad f(x)=x^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore f'(x) = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$$

$$3. \quad g(n)=\sqrt[3]{n}$$

$$g(n)=n^{\frac{1}{3}} \\ \therefore g'(n)=\frac{1}{3} n^{-\frac{2}{3}}$$

إذا كانت كل من f, g, h دوال قابلة للاشتقاق عند x وكذلك $c \in \mathbb{R}$

3.

$$f(x) = cg(x)$$

$$f'(x) = cg'(x)$$

4.

$$f(x) = g(x) \pm h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) \pm h'(x)$$

مثال 3 جد $h'(x), g'(x)$

$$1. \quad g(x) = \frac{3}{2x^2} + \frac{5x^2}{3} - \frac{7x}{5} - \frac{1}{6}$$

$$g(x) = \frac{3}{2} x^{-2} + \frac{5x^2}{3} - \frac{7x}{5} - \frac{1}{6}$$

$$g'(x) = -3x^{-3} + \frac{10x}{3} - \frac{7}{5}$$

$$2. \quad h(x) = 10 \left(\frac{x^2}{50} + \frac{x}{9} - \frac{1}{3} \right)$$

$$h'(x) = 10 \left(\frac{2x}{50} + \frac{1}{9} \right)$$

$$= 10 \left(\frac{x}{25} + \frac{1}{9} \right)$$

5.

$$f(x) = g(x) \cdot h(x)$$

$$f'(x) = g(x) h'(x) + h(x) g'(x)$$

مشتقة حاصل ضرب = الدالة الاولى \times مشتقة الدالة الثانية + الدالة الثانية \times مشتقة الدالة الاولى
دالتين

مثال 4

$$f(x) = (3-2x-x^5)(2x^7+5)$$

$$f'(x) = (3-2x-x^5)(14x^6) + (2x^7+5)(-2-5x^4)$$

6.

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \quad h(x) \neq 0$$

$$f'(x) = \frac{h(x)g'(x) - g(x)h'(x)}{(h(x))^2}$$

المقام \times مشتقة البسط - البسط \times مشتقة المقام
 مشتقة حاصل قسمة دالتين = $\frac{\text{المقام}^2}{\text{المقام}}$

مثال 5

$$f(x) = \frac{x^2+3x+1}{x^2+5}$$

جد $f'(x)$

التبسيط يترك للطالب

$$f'(x) = \frac{(x^2+5)(2x+3) - (x^2+3x+1)(2x)}{(x^2+5)^2}$$

ملاحظة :

$$\frac{d}{dx} (f(x)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

إذا كانت هذه الغاية موجودة تسمى المشتقة الثانية للدالة f بالنسبة إلى x ويرمز لها بالرمز:

$$f''(x) = y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2}{dx^2} (f(x))$$

وبالطريقة نفسها تعرف المشتقة الثالثة والرابعة

7.

إذا كان

$$g(x) = u^n$$

فإن

$$g'(x) = \frac{dg}{dx}$$

أي

$$\frac{d}{dx} (u)^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال 6

إذا كان $y = (1-x)^3$ جد y' ، y'' عند $x = 2$

الحل :

$$y = (1-x)^3$$

$$y' = 3(1-x)^2 (-1)$$

$$y' = -3(1-x)^2$$

$$x=2 \quad \text{عند}$$

$$\therefore y' = -3(1-2)^2 = -3$$

$$y'' = -6(1-x)(-1)$$

$$y'' = 6(1-x)$$

$$x=2 \quad \text{عندما}$$

$$y'' = 6(1-2) = -6$$

تمارين (1-6)

1.

أ. $f(x) = 3x^2 + 4x + 2$ باستخدام التعريف جد $f(1)$

ب. $g(x) = \sqrt{x}$ جد اوسع مجال الى الدالة ومشتقتها .

ج. $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ حيث $x \neq 1$ جد باستخدام التعريف $f(2)$

2. ابحث استمرارية وقابلية الاشتقاق لكل من الدوال التالية عند قيم x التي أمامها :

أ.
$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{إذا كان } x \leq 2 \\ 7-x & \text{إذا كان } x > 2 \end{cases}$$
 عند $x = 2$

ب.
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{إذا كان } x \geq -1 \\ -2x-1 & \text{إذا كان } x < -1 \end{cases}$$
 عند $x = -1$

3. جد $a, b \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2+5 & \text{إذا كان } x \geq 1 \\ ax+b & \text{إذا كان } x < 1 \end{cases}$$
 إذا كانت قابلة للاشتقاق عند $x=1$

4

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = |2x - 6|$$

هل الدالة قابلة للاشتقاق عند $x=3$.

5

باستخدام قواعد المشتقة جد المشتقة الاولى لكل مما يأتي ازاء العدد المؤشر امامها :-

1. $f(x) = 3x^2 + 5x + 8$

عند $x=1$

2. $f(x) = x \sqrt{x^2 + 3}$

عند $x=-1$

3. $f(x) = \left(\frac{x^2 + 3}{x^2 + 1} \right)^4$

عند $x=0$

4. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{(x^2 - x)^2}$

عند $x = -1$

6

جد y' , y'' عند $x = 1$. $y = \sqrt[3]{3x + 5}$

Chain Rule

[4-6] قاعدة السلسلة

1.

$y = f(n)$ f قابلة للاشتقاق عند n

$n = g(x)$ g قابلة للاشتقاق عند x

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \times \frac{dn}{dx}$$

مثال 1

إذا كان كل من $y = 3n^2 + 5$ و $n = 4x + 3$

جد : $\frac{dy}{dx}$

الحل :

$$\frac{dy}{dn} = 6n$$

$$\frac{dn}{dx} = 4$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \times \frac{dn}{dx}$$

$$= 6n (4)$$

$$= 24n$$

$$\therefore n = 4x + 3$$

$$\therefore = 24 (4x + 3)$$

$$= 96x + 72$$

حل آخر : نعوض عن قيمة n في $y = 3n^2 + 5$

$$\Rightarrow y = 3 (4x + 3)^2 + 5$$

$$\therefore \dot{y} = 6(4x+3)(4)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 24(4x+3) \\ = 96x+72$$

2.

$y = f(n)$ f قابلة للاشتقاق عند n

$x = g(n)$ g قابلة للاشتقاق عند n

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \div \frac{dx}{dn}$$

مثال 2

إذا كان

$$x = 3n - 4$$

$$y = 2n + 5$$

جد $\frac{dy}{dx}$: الحل :

$$\frac{dx}{dn} = 3$$

$$\frac{dy}{dn} = 2$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \div \frac{dx}{dn} \\ = \frac{2}{3}$$

مثال 3

إذا كان

$$y = 5n + 4$$

$$x = 3n + 1$$

جد $\frac{dy}{dx}$ عندما $n=1$

الحل :

$$\frac{dy}{dn} = 5$$

$$\frac{dx}{dn} = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dn} \div \frac{dx}{dn} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

عندما $n = 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5}{3}$$

مثال 4

إذا كان $y = n^2 + 3n + 2$

$$n = 2x + 1$$

جد $\frac{dy}{dx}$ عندما $x = 2$ الحل :

$$\frac{dy}{dn} = 2n + 3$$

$$\frac{dn}{dx} = 2$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dn} \times \frac{dn}{dx}$$

$$= (2n + 3) (2)$$

$$= 4n + 6$$

$$\therefore n = 2x + 1$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 4(2x + 1) + 6$$

$$= 8x + 4 + 6$$

$$= 8x + 10$$

عند $x = 2$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 16 + 10 = 26$$

3.

إذا كان $f(x)$ ، $g(x)$ كلاهما قابلة للاشتقاق عند x

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \text{فإن :}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad g(x) \quad \text{وإن :}$$

[5-6] معادلة المماس للمنحني والعمود على المماس

نعوض قيمة x_1 في الدالة نحصل على y_1 { لان $y = f(x)$ } النقطة (x_1, y_1) نعوض x_1 في المشتقة الاولى نحصل على ميل المماس عند تلك النقطة .

مثال 1

جد معادلة المماس للمنحني $f(x) = (3-x^2)^4$ عند $x = 2$

الحل :

$$f(2) = (3-4)^4 = 1$$

النقطة $(2, 1)$.

$$f'(x) = 4(3-x^2)^3(-2x)$$

$$f'(2) = 4(3-4)^3(-4)$$

$$= 4(-1)^3(-4) = 16 \quad \text{ميل المماس}$$

نطبق القاعدة :

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$16 = \frac{y - 1}{x - 2}$$

$$16x - 32 = y - 1$$

$$16x - y - 32 + 1 = 0$$

$$16x - y - 31 = 0$$

مثال 2

جد معادلة المماس والعمود على المماس للمنحني $f(x) = (2x-1)^5$ عند $x = 1$

الحل :

$$f(1) = (2-1)^5 = 1$$

$$\therefore (1, 1)$$

نقطة التماس

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5(2x-1)^4 \quad (2) \\ &= 10(2x-1)^4 \end{aligned}$$

ميل المماس في أي نقطة

$$f'(1) = 10(2-1)^4 = 10$$

ميل المماس في نقطة التماس

$$10 = \frac{y-1}{x-1}$$

$$10x - 10 = y - 1$$

$$10x - y - 9 = 0$$

معادلة المماس

$$\frac{-1}{10} = \text{ميل العمود}$$

$$\frac{-1}{10} = \frac{y-1}{x-1}$$

$$\left(\frac{-1}{\text{ميل المماس}} = \text{ميل العمود} \right)$$

$$\Rightarrow 10y - 10 = -x + 1$$

$$x + 10y - 10 = 1$$

$$10y + x - 11 = 0 \quad \text{معادلة العمود}$$

جد معادلة المماس لمنحني الدالة $y = (fog)(x)$ عند $x=1$ إذا كان

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$g(x) = 3x+5$$

الحل :

$$(fog)(x) = f[g(x)]$$

$$= \sqrt[3]{3x+5}$$

$$\therefore y = \sqrt[3]{3x+5}$$

عندما $x=1$

$$y = \sqrt[3]{3+5} = 2 \Rightarrow (1, 2) \text{ نقطة التماس}$$

$$(fog)(x) = (3x+5)^{\frac{1}{3}}$$

$$(fog)'(x) = \frac{1}{3} (3x+5)^{-\frac{2}{3}} \times 3$$

$$(fog)'(1) = \frac{1}{3} (2^3)^{-\frac{2}{3}} \times 3$$

$$= \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} \quad \text{ميل لمماس في نقطة التماس}$$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{y - 2}{x - 1}$$


$$\Rightarrow x-1 = 4y-8$$

$$x-4y+7=0 \quad \text{معادلة المماس}$$

Implicit Differentiation

[6-6] الاشتقاق الضمني

حين تكون y دالة معطاة في x أي $y = f(x)$ ، فيقال ان الدالة صريحة ويسمى x بالمتغير المستقل بينما y بالمتغير التابع .




شكل (6-6)

$x^2 + y^2 = 25$ معادلة دائرة وهي ليست دالة .

$$y^2 = 25 - x^2 \quad \text{لكن}$$

$$y = \pm \sqrt{25 - x^2}$$


فلو رسمنا $y = \sqrt{25 - x^2}$ لوجدنا انه يمثل نصف الدائرة الاعلى كما في الشكل (6-7):



شكل (6-7)

وكذلك $y = -\sqrt{25 - x^2}$ وهي تمثل نصف الدائرة الاسفل الشكل (6-8):

ولكل من العلاقتين :



شكل (6-8)

$$y = -\sqrt{25 - x^2} \quad . \quad y = \sqrt{25 - x^2}$$

يمثلان دالة مجالها $[-5, 5]$

أي أننا عرفنا دالتين ضمن العلاقة $x^2 + y^2 = 25$ والتي كما اسلفنا لا تمثل دالة يقال لكل من

$$y = -\sqrt{25 - x^2} \quad . \quad y = \sqrt{25 - x^2} \quad \text{دالة ضمنية.}$$

ولإيجاد مشتقة العلاقة : لتكن $y = f(x)$

$$x^2 + (f(x))^2 = 25$$

$$2x + 2(f(x)) f'(x) = 0$$

$$\therefore f(x) = y, f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y \frac{dy}{dx} = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

مثال 1

إذا كان $x^2 - y^2 = 7y - x$ جد

$$\frac{dy}{dx}$$

الحل :

$$2x - 2y \frac{dy}{dx} = 7 \frac{dy}{dx} - 1$$

$$2x + 1 = 7 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx}$$

$$2x + 1 = \frac{dy}{dx} (7 + 2y)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2x + 1}{7 + 2y}$$

مثال 2

جد معادلة المماس للدائرة التي معادلتها $x^2 + y^2 = 25$ عند النقطة $(-3, 4)$

الحل :

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$2y \frac{dy}{dx} = -2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{y-4}{x+3} = \frac{3}{4}$$

$$3x + 9 = 4y - 16$$

$$3x - 4y + 25 = 0$$

مثال 3

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} + 1 = 0 \quad \text{إذا كان } x^2 + y^2 = 10 \text{ أثبت أن :}$$

الحل :

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$x + y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$1 + y \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \times \frac{dy}{dx} = 0$$

$$1 + y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0 \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} + 1 = 0 \quad (\text{و.ه.م})$$

مثال 4

جسم يتحرك على خط مستقيم وفقاً للقاعدة $P(t) = \frac{1}{3} t^3 - 2t^2 + 3t + 5$ حيث $p(t)$ الازاحة بالامتار، t الزمن بالثواني ، جد السرعة عندما التعجيل = صفر

$$p'(t) = \frac{1}{3} (3) t^2 - 4t + 3 \quad \text{السرعة}$$

$$p''(t) = 2t - 4 \quad \text{التعجيل}$$

$$2t - 4 = 0$$

$$t - 2 = 0$$

$$t = 2$$

$$p'(2) = 4 - 8 + 3 = -1 \quad \text{السرعة عندما التعجيل = صفر}$$

مثال 5

لتكن $v(t)$ سم اثا سرعة جسم يتحرك على خط مستقيم $v(t) = 3t^2 - 6t + 9$

1. جد السرعة عندما $t=2$ ثا .

2. جد السرعة عندما التعجيل = صفر .

الحل :

$$1. v(2) = 3(2)^2 - 6(2) + 9$$

$$= 12 - 12 + 9 = 9 \quad \text{سم/ثا}$$

$$2. v'(t) = 6t - 6 \quad \text{التعجيل}$$

$$6t - 6 = 0$$

$$6t = 6$$

$$t = 1$$

$$v(1) = 3 - 6 + 9 = 6 \quad \text{السرعة عندما التعجيل = صفر سم/ثا}$$

تمارين (2-6)

1. إذا كان : $g(x) = (1+2x^2+5x)^{3/2}$

$f(x) = 2x$

جد : $(g \circ f)(0)$

2. إذا كان : $y = n^3 + 3n - 5$

$n = 2x + 1$

جد : $\frac{dy}{dx}$



3. إذا كان $y = an^2 + 3n - 7$

$n = 2x + 1$

وكان $\frac{dy}{dx} = 30$ عندما $x = 1$ ، جد قيمة a

4. إذا كان : $y = 3n^2 + 2n + 4$

$x = 8n + 5$

جد : $\frac{dy}{dx}$ عندما $n = 1$

5. إذا كان $xy^2 + 4x^2 = 7x - 2y$

جد : $\frac{dy}{dx}$

6. إذا كان $xy^2 + yx^2 = 2$

اثبت أن $\frac{dy}{dx} = -1$ عند $(1, 1)$

7. جسم يتحرك على خط مستقيم وفق القاعدة $p(t)=24t^2-t^3$

حيث: $p(t)$ الازاحة بالامتار t الزمن بالثواني

1. جد سرعة الجسم بعد 2 ثا من بدء الحركة .

2. جد الازاحة عندما التعجيل = صفر.

8. لتكن $v(t)$ سم/ثا تمثل سرعة جسم يتحرك على خط مستقيم وإن

$$v(t)=t^3-t^2+5$$

جد السرعة عندما التعجيل = 8 سم/ثا²

9. جد معادلة المماس لمنحني الدالة

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3} \quad \text{عندما } x = -1$$

10. اذا كان : $f(x) = x - x^2$

$$g(x) = \sqrt{2x+1}$$

حيث : $x \geq -\frac{1}{2}$

جد معادلة المماس للمنحني $(fog)(x)$ عند $x = 4$

11. جد معادلتى المماس للمنحني $x^2+y^2-5xy=15$ عند $y = -2$

[6-7] مشتقات الدوال الدائرية Derivative of the Circular functions

عرفنا سابقاً ان المشتقة الاولى للدالة f عند x = a هي :

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

ويمكن استخدام هذا التعريف لبرهان

1.

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos \Delta x + \cos x \sin \Delta x - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\sin x (1 - \cos \Delta x) + \cos x \sin \Delta x}{\Delta x} \\ &= -\sin x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x} + \cos x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \\ &= -\sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

ملاحظة :

sin x جاس هو

cos x جتا س هو

tan x tangent ظا س هو

cot x cotangent ظتا س هو

sec x secant قاس هو

csc x cosecant قتا س هو

$$2. f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f(x) = \cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

$$f'(x) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) (-1)$$

$$f'(x) = -\sin x$$

البرهان :

القواعد الأخرى سنطرحها بدون برهان :

$$1. \frac{d}{dx} (\sin y) = \cos y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin 5x = \cos 5x \cdot 5$$

مثال

$$2. \frac{d}{dx} \cos y = -\sin y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \cos x/2 = -\sin \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

مثال

$$3. \frac{d}{dx} (\tan y) = \sec^2 y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \tan x^2 = \sec^2 x^2 \cdot 2x$$

مثال

$$4. \frac{d}{dx} \cot y = -\csc^2 y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \cot 8x = -\csc^2 8x \cdot (8)$$

مثال

$$5. \frac{d}{dx} \sec y = \sec y \tan y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \sec 4x = \sec 4x \tan 4x \cdot (4)$$

مثال

$$6. \frac{d}{dx} \csc y = -\csc y \cot y \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \csc 5x = -\csc 5x \cot 5x \cdot 5$$

مثال

مثال 1

$$f(x) = \sin (7x^2 + 4x + 1)$$

جد $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos (7x^2 + 4x + 1)(14x + 4) \\ &= (14x + 4)\cos (7x^2 + 4x + 1) \end{aligned}$$

الحل :

مثال 2

$$f(x) = \sin \sqrt[3]{x}$$

$$= \sin x^{\frac{1}{3}}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{3} x^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{3} x^{\frac{-2}{3}} \cos \sqrt[3]{x} \\ &= \frac{\cos \sqrt[3]{x}}{3 \sqrt[3]{x^2}} \end{aligned}$$

مثال 3

$$f(x) = \cos^3 7x$$

$$f(x) = (\cos 7x)^3$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 (\cos 7x)^2 (-\sin 7x \cdot 7) \\ &= -21 \cos^2 7x \sin 7x \end{aligned}$$

مثال 4

$$f(x) = \cos 3x - \tan 5x + \sec 4x$$

$$f'(x) = -3 \sin 3x - 5 \sec^2 5x + 4 \sec 4x \tan 4x$$

مثال 5

جد معادلة المماس عند $x = 0$ للدالة $f(x) = 3 \sin x + 4 \cos x$

$$f(x) = 3 \sin x + 4 \cos x$$

الحل :

$$f(0) = 3 \sin 0 + 4 \cos 0 = 0 + 4 \times 1 = 4$$

نقطة التماس (0,4)

$$f'(x) = 3 \cos x - 4 \sin x$$

$$f'(0) = 3 \cos 0 - 4 \sin 0$$

$$= 3 - 0 = 3 \quad \text{ميل المماس}$$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$3 = \frac{y - 4}{x - 0}$$

$$3x = y - 4$$

$$3x - y + 4 = 0 \quad \text{معادلة المماس}$$

مثال 6

$$f(x) = (\sec 5x)^3$$

$$f'(x) \quad \text{جد}$$

الحل :

$$f(x) = (\sec 5x)^3$$

$$f'(x) = 3 (\sec 5x)^2 (\sec 5x \tan 5x \cdot 5)$$

$$= 15 \sec^3 5x \tan 5x$$

مثال 7

جسم يتحرك على خط مستقيم وفقا للقاعدة: $p(t) = 3\cos 2t$ حيث $p(t)$ الازاحة بالامتار
، الزمن بالثواني. جد السرعة عندما $t = 0$ ، جد التعجيل عند $t = \frac{\pi}{6}$.

الحل :

$$p'(t) = -3 \sin 2t \cdot 2$$

$$= -6 \sin 2t$$

$$p'(0) = -6 \sin 0 = 0 \text{ m/sec} \quad t = 0 \text{ السرعة عندما}$$

$$p''(t) = -6 \cos 2t \cdot 2$$

$$= -12 \cos 2t$$

$$p''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -12 \cos \frac{\pi}{3} = -12 \times \frac{1}{2} = -6 \text{ m/sec}^2$$



تمارين (3-6)



1. جد \dot{y}

1. $y = \sin(5 - x^3)$

3. $y = x \sec x^2$

5. $y = \sqrt[3]{\cot^2 4x}$

7. $y = (\sin 3x - \cos 3x)^2$

2. $y = \sqrt{\cos(4x + 2)}$

4. $y = \sin 3x \cos 3x$

6. $y = \csc^5(x^2 + 1)$

2. إذا كان $\sin xy^2 = 4x - 3y$ جد $\frac{dy}{dx}$

3. أثبت صحة

a $\frac{d}{dx} \left[\sin ax - \frac{1}{3} \sin^3 ax \right] = a \cos^3 ax$

b.
$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2 - \cos x}{2 + \cos x} \right) = \frac{4 \sin x}{(2 + \cos x)^2}$$

4. جد : y''

$$y = \cos^4 x - \sin^4 x$$

5. جد معادلة المماس للمنحني $f(x) = \sin 2x + \sin x$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ عند}$$

6. جسم يتحرك على خط مستقيم وفقاً للقاعدة $p(t) = \sin 2t - \cos 2t$

حيث $p(t)$ الازاحة بالامتار، t الزمن بالثواني.

جد كلاً من بعد الجسم ، سرعته وتعجيله عندما $t = \pi / 4$

7. اذا كان $v(t)$ سم / ثا تمثل سرعة جسم متحرك على خط مستقيم حيث

$$v(t) = 4 \sin \frac{t\pi}{4} + 8 \cos \frac{t\pi}{4}$$

جد السرعة والتعجيل عندما $t = 1$

Chapter 7

الهندسة الفضائية (المجسمة) Space Geometry

تمهيد

[7-1] العلاقة بين مستويين في الفضاء

[7-2] مبرهنة (1)

[7-2-1] نتيجة

[7-3] مبرهنة (2)

[7-4] مبرهنة (3)

[7-5] مبرهنة (4)

[7-5-1] نتيجة

[7-6] تعامد المستقيمت والمستويات

[7-7] مبرهنة (5)


[7-7-1] نتيجة

[7-8] مبرهنة (6) (الاعمدة الثلاثة)

[7-8-1] نتيجة

[1-7] العلاقة بين مستويين في الفضاء

المستويان المتوازيان : اذا لم يشتركا بأية نقطة




$$(X) \cap (Y) = \emptyset$$

$$\therefore (X) // (Y)$$

المستويان المتقاطعان : اذا اشتركا بمستقيم واحد فقط

$$(X) \cap (Y) = \overleftrightarrow{AB}$$



نلاحظ انه اذا اشترك المستويان بنقطة فانهما يشتركان بخط مستقيم يحوي جميع النقاط المشتركة بين المستويين المتقاطعين ويسمى (مستقيم التقاطع) ويكون محتوي في كليهما

ملاحظة :

- 1 التساوي : إسمان لشيء واحد.
- 2 كل مستقيم يوازي نفسه.
- 3 كل مستوي يوازي نفسه.

مما تقدم نستنتج:

1 إذا توازي مستقيمان فالمستوي المار باحدهما ونقطة من الآخر فانه يحويهما


$$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$$

إذا كان

$$\overleftrightarrow{AB} \subset (X)$$

$$C \in (X)$$

$$\overleftrightarrow{CD} \subset (X) \quad \text{فإن}$$




2 المستوي الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين يقطع الآخر.

$$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$$

$$\overleftrightarrow{AB} \text{ يقطع } (X) \text{ في } E$$

$$\therefore \overleftrightarrow{CD} \text{ يقطع } (X) \text{ في } F$$




3 إذا توازي مستويان فالمستقيم المحتوي في احدهما يوازي الآخر

$$(X) // (Y)$$

$$\overleftrightarrow{AB} \subset (X)$$

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} // (Y)$$





4 إذا وازى ضلعاً زاوية ضلعي زاوية أخرى تساوت قياسهما او تكاملتا وتوازي مستويهما

$$\overleftrightarrow{AC} // \overleftrightarrow{DF}$$

$$\overleftrightarrow{BD} // \overleftrightarrow{EG}$$

$$\therefore m\angle 1 = m\angle 3$$

$$m\angle 2 + m\angle 3 = 180^\circ, (X) // (Y)$$




Theorem : (1) مبرهنة [7-2]

خط تقاطع مستويين متوازيين بمستوى ثالث متوازيين

المعطيات:

$$\begin{aligned} (X) // (Y) \\ (X) \cap (Z) &= \overleftrightarrow{AB} \\ (Y) \cap (Z) &= \overleftrightarrow{CD} \end{aligned}$$



$$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD} \text{ : المطلوب اثباته}$$

البرهان

$$\left. \begin{aligned} (X) \cap (Z) &= \overleftrightarrow{AB} \\ (Y) \cap (Z) &= \overleftrightarrow{CD} \end{aligned} \right\} \text{ (معطى)}$$

$$\left. \begin{aligned} \therefore \overleftrightarrow{AB} \subset (X), \overleftrightarrow{AB} \subset (Z) \\ \overleftrightarrow{CD} \subset (Y), \overleftrightarrow{CD} \subset (Z) \end{aligned} \right\}$$

(مستقيم التقاطع يحوي جميع النقاط المشتركة
بين المستويين المتقاطعين)

في (Z) اذا لم يكن $\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$ فسوف يقطعه في نقطة مثل E

$$\left. \begin{aligned} \therefore E \in \overleftrightarrow{AB} \subset (X) &\Rightarrow E \in (X) \\ E \in \overleftrightarrow{CD} \subset (Y) &\Rightarrow E \in (Y) \end{aligned} \right\}$$

(مستقيم التقاطع يحوي جميع النقاط المشتركة
بين المستويين المتقاطعين)

$$\therefore E \in (X) \cap (Y) \quad (\text{لاشتراكهما في نقطة } E)$$

وهذا خلاف الفرض حيث $(X) // (Y)$


اذن \overleftrightarrow{AB} لا يقطع \overleftrightarrow{CD}

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD} \text{ (يتوازي المستقيمان اذا وقعا في مستو واحد وغير متقاطعين)}$$

و.ه.م

[7-2-1] نتيجة (1):

المستقيم الذي يقطع احد مستويين متوازيين يقطع الاخر ايضاً



المعطيات: $(X) // (Y)$, \overleftrightarrow{AB} يقطع (X) في B
المطلوب اثباته: \overleftrightarrow{AB} يقطع (Y)

البرهان: لتكن $E \in (Y)$

(يمكن رسم مستقيم موازٍ لآخر من نقطة لا تنتمي اليه)
نرسم $\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{EN}$
نعين (Z) بالمستقيمين \overleftrightarrow{AB} , \overleftrightarrow{EF} (يتعين مستو وحيد بمستقيمين متوازيين)
(خط تقاطع مستويين متوازيين بمستو ثالث متوازيين) $\overleftrightarrow{EM} // \overleftrightarrow{FB}$

اذن \overleftrightarrow{AB} يقطع (Y) في M

و. ه. م


[7-3] مبرهنة (2) : Theorem

اذا توازي مستقيمان فالمستوي الذي يحوي احدهما يوازي الاخر

المعطيات:

$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$, $CD \subset (X)$

$\overleftrightarrow{AB} // (X)$



المطلوب اثباته:

البرهان: إذا كان \overleftrightarrow{AB} لايوازي (X) فيقطعه بنقطة مثل E

$\therefore \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$ (معطى)

(المستوي الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين يقطع الاخر) \therefore (X) يقطع \overleftrightarrow{CD}

وهذا خلاف الفرض لان (X) $\overleftrightarrow{CD} \subset$

اذن \overleftrightarrow{AB} لا يقطع (X)

$\therefore \overleftrightarrow{AB} // (X)$

و.ه.م

Theorem (3) مبرهنة [7-4]


المستقيمان الموازيان لمستقيم ثالث (في الفراغ) متوازيان

المعطيات :

$\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{R}, \overleftrightarrow{K} // \overleftrightarrow{R}$

$\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{K}$

المطلوب اثباته:



البرهان: لتكن $A \in \overleftrightarrow{K}$

بالمستقيم L ونقطة A نعين (X)

[يتعين مستو وحيد بمستقيم ونقطة لا تنتمي اليه]

ان لم يكن $\overleftrightarrow{K} \subset (X)$ فسوف يقطعه في A

\therefore (X) يقطع \overleftrightarrow{R} وهذا مستحيل

(المستوي الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين يقطع الاخر)

$\therefore \overleftrightarrow{K} \subset (X)$

في (X) ان لم يكن $\overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{K}$ ، فيقطعه في نقطة مثل M

ينتج وجود مستقيمين مرسومين من M يوازيان \overleftrightarrow{R} وهذا خلاف الفرض (عبارة التوازي)

اذن \overleftrightarrow{K} لا يقطع L

$\therefore \overleftrightarrow{L} // \overleftrightarrow{K}$

و.ه.م

Theorem [7-5] مبرهنة (4):


مستقيم تقاطع مستويين يوازي كل مستقيم محتوي في احدهما ويوازي الآخر

المعطيات:

$$(X) \cap (Y) = \overleftrightarrow{AB}$$

$$\overleftrightarrow{CD} \subset (Y), \overleftrightarrow{CD} // (X)$$

$$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$$



المطلوب اثباته:

البرهان:

$$\overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD} \subset (Y)$$

$$\overleftrightarrow{CD} // (X) \text{ (معطى)}$$

في (Y) لو كان \overleftrightarrow{CD} يقطع \overleftrightarrow{AB} لننتج ان \overleftrightarrow{CD} يقطع (X)

(مستقيم التقاطع يحوي جميع النقاط المشتركة بين المستويين المتقاطعين)

وهذا خلاف الفرض حيث


$$\overleftrightarrow{CD} // (X)$$

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$$

و. ه. م

[1-5-7] نتيجة (1)

إذا وازى مستقيم مستويًا معلومًا فالمستقيم المرسوم من أية نقطة من نقاط المستوي موازيًا للمستقيم المعلوم يكون محتوي في المستوي



المعطيات :

$$C \in (X), \overleftrightarrow{AB} \parallel (X) \\ \overleftrightarrow{CD} \parallel \overleftrightarrow{AB}$$

المطلوب اثباته

$$\overleftrightarrow{CD} \subset (X)$$


البرهان :

ان لم يكن $\overleftrightarrow{CD} \subset (X)$ فيكون قاطعاً له في نقطة C
 $\therefore (X)$ يقطع \overleftrightarrow{AB} (المستوي الذي يقطع احد مستقيمين متوازيين يقطع الاخر)
وهذا خلاف الفرض حيث $\overleftrightarrow{AB} \parallel (X)$

\therefore اذن \overleftrightarrow{CD} لا يقطع (X) بل محتوي فيه

و. هـ. م

مثال: إذا احتوى كل من مستويين متقاطعين على أحد مستقيمين متوازيين فمستقيم التقاطع يوازي كلا من المستقيمين المتوازيين



المعطيات :

$$(X) \cap (Y) = \overleftrightarrow{EF}, \overleftrightarrow{AB} \subset (X), \overleftrightarrow{CD} \subset (Y), \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD}$$

المطلوب اثباته :

$$\overleftrightarrow{EF} // \overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD}$$

البرهان :

$$\overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{CD} \text{ (معطى)}$$

$$\overleftrightarrow{CD} \subset (Y)$$

$\therefore \overleftrightarrow{AB} // (Y)$ (إذا توازي مستقيمان فالمستوي الذي يحوي احدهما يوازي الآخر)

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} \subset (X) \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} // \overleftrightarrow{EF}$$

(مبرهنة (4) مستقيم تقاطع مستويين يوازي كل

مستقيم محتوي في احدهما ويوازي الآخر)

$$\overleftrightarrow{CD} // \overleftrightarrow{EF}$$

(المستقيمان الموازيان لمستقيم ثالث متوازيان)

و. ه. م

تمارين (1-7)

1 / اي من العبارات الآتية خاطئة واي منها صائبة وبين السبب :

- أ - اذا كان $\overleftrightarrow{AB} // (X)$ فيوجد مستقيم وحيد يوازي \overleftrightarrow{AB} ومحتوى في (X) .
- ب - يوجد مستو وحيد مواز لمستوي معلوم .
- ج - المستقيمان الموازيان لمستوي واحد متوازيان .
- د - اذا وازى ضلعان من مثلث مستوياً معلوماً كان ضلعه الثالث موازياً للمستوي المعلوم .
- هـ - اذا كان (X) ، (Y) مستويين غير متوازيين فانهما يتقاطعان بنقطة واحدة .
- و - اذا كانت $A, B \in (X)$ فان $\overleftrightarrow{AB} \cap (X) = \{A, B\}$.
- ز - كل مستقيم يمكن ان يمر به عدد غير منته من المستويات .
- ح - عدد المستويات المختلفة المارة بثلاث نقاط مختلفة ليست على استقامة واحدة هو (3) مستويات .
- ط - يوجد مستوي وحيد يحوي مستقيمين متخالفين .


2 / صحح ما تراه خطأ في العبارات الآتية :

- أ - اذا كان $\overleftrightarrow{K} \subset (X)$ ، $\overleftrightarrow{L} \cap (X) = \{A\}$ فان $\overleftrightarrow{A} = \overleftrightarrow{L} \cap \overleftrightarrow{K}$ حيث $A \in (X)$
- ب - يتقاطع المستويان المختلفان في مستوي .
- ج - اذا كان تقاطع المستقيم L والمستوي (X) يساوي \emptyset فان $\overleftrightarrow{L} // (X)$
- د - اذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{L} // (X)$ فان $\overleftrightarrow{L} \cap (X) = \{A\}$ حيث $A \in (X)$
- هـ - اذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{K} \subset (X)$ فان $\overleftrightarrow{K} \cap (X) = \emptyset$
- و - يكون المستويان متوازيين اذا اشتركا في نقطة واحدة على الاقل .
- ز - المستقيم المحتوي في احد مستويين متوازيين يقطع المستوي الآخر .
- ح - يكون المستقيم محتوي في المستوي عندما يشترك معه بنقطة واحدة على الاقل.
- ط - اذا توازي مستقيمان ومر بكل منهما مستو وتقاطع المستويان فان مستقيمي تقاطعهما يقطع كلا المستقيمين .
- ي - اذا قطع مستوي كلا من مستويين متوازيين فان خطي تقاطعه معهما يكونان متخالفين .

[6-7] تعامد المستقيمت والمستويات:

تعريف:


1 المستقيم العمودي على مستوي يكون عمودياً على جميع المستقيمت المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي



$$\begin{aligned} \vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}, \vec{OE}, \dots \subset (X), \quad \vec{L} \perp (X) \\ \vec{L} \perp \vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}, \vec{OE}, \dots \end{aligned}$$

فيكون:


2 المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة تقاطعهما يكون عمودياً على مستويها



$$\begin{aligned} \vec{BC}, \vec{BD} \subset (X) \\ \vec{AB} \perp \vec{BC}, \vec{BD} \\ \vec{AB} \perp (X) \text{ فيكون:} \end{aligned}$$

وهو الشرط اللازم والكافي كي يكون المستقيم عمودياً على المستوي.


3 من نقطة معلومة يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستوي معلوم



c نقطة أما $c \in (X)$ او $c \notin (X)$

∴ يوجد مستقيم وحيد مثل \overleftrightarrow{L} يمر من نقطة c بحيث $\overleftrightarrow{L} \perp (X)$

4 يكون المستقيم \overleftrightarrow{AB} مائلاً على المستوي (X) اذا كان قاطعاً له وغير عمودي عليه.



$$\overleftrightarrow{AB} \cap (X) = \{c\}$$


\overleftrightarrow{AB} غير عمودي (X)

\overleftrightarrow{AB} مائل على (X)

ملاحظة:

يكون \overleftrightarrow{AB} غير عمودي على (X) إذا كان مائلاً عليه أو موازياً له


5 يقال لطول قطعة المستقيم المحددة بنقطة معلومة وأثر العمود النازل منها على المستوي المعلوم [بعد النقطة المعلوم عن المستوي]



AB هو بعد النقطة A عن (X)

وهو أقصر مسافة بين النقطة A و (X)

6 يقال لطول القطعة المستقيمة العمودية على مستويين متوازيين والمحددة بهما [البعد بين المستويين المتوازيين]



ملاحظة:


البعد بين مستويين متوازيين ثابت

$$(X) \parallel (Y), \overline{AB} \perp (X), \overline{AB} \perp (Y)$$

إذا كان

$\therefore AB$ يمثل البعد بين (X) و (Y)

7 المستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين يكون عمودياً على الآخر




إذا كان

$$\begin{aligned} (X) & // (Y) \\ \overleftrightarrow{AB} & \perp (X) \\ \overleftrightarrow{AB} & \perp (Y) \end{aligned}$$

فان

8 المستويان العموديان على مستقيم واحد متوازيان



إذا كان

$$\begin{aligned} \overleftrightarrow{AB} & \perp (X) \\ \overleftrightarrow{AB} & \perp (Y) \\ \therefore (X) & // (Y) \end{aligned}$$

فان

[7-7] مبرهنة (5): Theorem


المستوي العمودي على أحد مستقيمين متوازيين يكون عمودياً على الآخر

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}, \quad \overrightarrow{AB} \perp (X) \\ \overrightarrow{CD} \perp (X)$$

المعطيات :

المطلوب اثباته :

البرهان :



(المستوي الذي يقطع أحد مستقيمين متوازيين يقطع الآخر) $\overrightarrow{CD} \cap (X) = \{D\}$

في (X) نرسم $\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF}$

ثم نرسم

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{DG} \parallel \overrightarrow{BE} \\ \overrightarrow{DH} \parallel \overrightarrow{BF} \end{array} \right\} \text{عبارة التوازي}$$

$$\therefore m \angle ABE = m \angle CDG$$

$$m \angle ABF = m \angle CDH$$

$$\overrightarrow{AB} \perp (X) \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BF}$$

(إذا وازى ضلعاً زاوية ضلعي زاوية أخرى

تساوى قياسهما وتوازي مستواهما)

(العمود على مستوي يكون عمودياً على جميع

المستقيمات المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي)

$$\therefore m \angle ABE = m \angle CDG = 90^\circ$$

$$m \angle ABF = m \angle CDH = 90^\circ$$

$$\therefore \overrightarrow{CD} \perp (X)$$


(المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة تقاطعهما

يكون عمودياً على مستويها)

و. ه. م

[7-7-1] نتيجة:

المستقيمان العموديان على مستو واحد متوازيان



$$\begin{aligned} \overleftrightarrow{AB}, \overleftrightarrow{CD} &\perp (X) \\ \overleftrightarrow{AB} &\parallel \overleftrightarrow{CD} \end{aligned}$$

المعطيات:

المطلوب اثباته:

البرهان: ان لم يكن $\overleftrightarrow{CD} \parallel \overleftrightarrow{AB}$,
من $D \in (X)$ نرسم $\overleftrightarrow{DE} \parallel \overleftrightarrow{AB}$

(يمكن رسم مستقيم وحيد مواز لآخر من نقطة لا تنتمي اليه)

$\therefore \overleftrightarrow{AB} \perp (X)$ (معطى)

$\therefore \overleftrightarrow{DE} \perp (X)$

(المستوي العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عمودياً على الآخر)

$\therefore \overleftrightarrow{CD} \perp (X)$ (معطى)

أصبح من نقطة D وجود مستقيمين عموديين على (X) وهذا غير ممكن (من نقطة معلومة يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستو معلوم)


$\therefore \overleftrightarrow{DE} \equiv \overleftrightarrow{DC}$

$\therefore \overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{CD}$

و. ه. م

[7 - 8] مبرهنة (6) Theorem

مبرهنة الأعمدة الثلاثة: إذا رسم من نقطة في مستويين مستقيمان أحدهما عمودي على المستوي والآخر عمودي على مستقيم معلوم في المستوي فالمستقيمين الواصل بين أية نقطة من نقط المستقيم العمودي على المستوي ونقطة تلاقي المستقيمين يكون عمودياً على المستقيم المعلوم في المستوي.



$$B \in (X), \overleftrightarrow{CD} \subset (X), \overleftrightarrow{AB} \perp (X), \overleftrightarrow{BE} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

$$\forall N \in \overleftrightarrow{AB} \Rightarrow \overleftrightarrow{NE} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

المعطيات :

المطلوب اثباته:

البرهان: من نقطة B نرسم $\overleftrightarrow{BF} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ (عبارة توازي)

$$\therefore \overleftrightarrow{CD} \subset (X) \text{ معطى}$$

$$\Rightarrow \overleftrightarrow{BF} \subset (X)$$

(إذا توازي مستقيمان فالمستوي الذي يحوي أحدهما ونقطة من الآخر يحتويها)

$$\therefore \overleftrightarrow{BE} \perp \overleftrightarrow{CD} \text{ (معطى)}$$

$$\Rightarrow \overleftrightarrow{BF} \perp \overleftrightarrow{BE}$$

(في المستوي الواحد المستقيم العمود على احد مستقيمين متوازيين يكون عمودياً على الآخر)

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} \perp (X) \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overleftrightarrow{NB} \perp \overleftrightarrow{BF}$$

(المستقيم العمودي على مستوي يكون عمودياً على جميع المستقيمت المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي)
(المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة تقاطعهما يكون عمودياً على مستوييهما)

$$\Rightarrow \overleftrightarrow{BF} \perp (NBE)$$

(المستوي العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عمودياً على الآخر)

$$\therefore \overleftrightarrow{CD} \perp (NBE)$$

(المستقيم العمودي على مستوي يكون عمودياً على جميع المستقيمت المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي)


$$\therefore \overleftrightarrow{EN} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

وهذا شأن كل مستقيم يصل أية نقطة من نقاط \overleftrightarrow{AB} بالنقطة E يكون عمودياً على \overleftrightarrow{CD}

و . ه . م

نتيجة مبرهنة (6) الاعمدة الثلاثة

إذا رسم من نقطة لا تنتمي الى مستوي معلوم مستقيمان احدهما عمودي على المستوي والآخر عمودي على مستقيم معلوم في المستوي. فالمستقيم الواصل بين أثري العمودين يكون عمودياً على المستقيم المعلوم في المستوي



المعطيات:

$$A \notin (X), \overleftrightarrow{CD} \subset (X), \overleftrightarrow{AB} \perp (X), \overleftrightarrow{AE} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

$$\overleftrightarrow{BE} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

المطلوب اثباته:

البرهان: إن لم يكن $\overleftrightarrow{BE} \perp \overleftrightarrow{CD}$ من نقطة B نرسم $\overleftrightarrow{NB} \perp \overleftrightarrow{CD}$

(يمكن رسم مستقيم عمود وحيد على مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي اليه)

$$\therefore \overleftrightarrow{AB} \perp (X) \text{ (معطى)}$$

$$\overleftrightarrow{AN} \perp \overleftrightarrow{CD} \text{ (مبرهنة الاعمدة الثلاثة)}$$

$$\overleftrightarrow{AE} \perp \overleftrightarrow{CD} \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overleftrightarrow{AN} \equiv \overleftrightarrow{AE} \text{ (يمكن رسم مستقيم عمود وحيد على مستقيم معلوم من نقطة لا تنتمي اليه)}$$

$$\therefore N = E$$


$$\Rightarrow \overleftrightarrow{BE} \equiv \overleftrightarrow{BN}$$

$$\therefore \overleftrightarrow{BE} \perp \overleftrightarrow{CD}$$

و. ه. م

أمثلة محلولة

1 مثلث BCD قائم الزاوية في B ، A نقطة ليست في مستوي هذا المثلث بحيث $AC = CD$ ،
 برهن أن \overline{BC} عمودي على مستوي المثلث ABD



المعطيات:

المثلث BCD قائم الزاوية في B

$A \notin (BCD)$ ، $AB = BD$ ، $AC = CD$

مطلوب اثباته: $\overline{BC} \perp (ABD)$

البرهان: المثلثان ABC ، BCD

$AB = BD$ (معطى)

$AC = CD$

\overline{BC} مشترك

∴ يتطابق المثلثان (التساوي ثلاث اضلاع)

من التطابق ينتج

$m \angle CBD = m \angle ABC = 90^\circ$

∴ $\overline{BC} \perp \overline{BD}$

(معطى $m \angle CBD = 90^\circ$)

$\overline{BC} \perp \overline{AB}$

(بالبرهان $m \angle ABC = 90^\circ$)


∴ $\overline{BC} \perp (ABD)$

(المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة

تقاطعهما يكون عمودياً على مستويها)

و . ه . م

2 **AB** قطر في دائرة من نقطة مثل **C** على الدائرة رسم $\overline{CD} \perp$ مستوي الدائرة برهن ان \overline{AC} عمودي على المستوي (BCD)



المعطيات: \overline{AB} قطر دائرة ، **C** نقطة على الدائرة ، \overline{CD} عمود على مستوي الدائرة

المطلوب اثباته: $\overline{AC} \perp (BCD)$

البرهان:

$\therefore \overline{AB}$ ، قطر دائرة مركزها **O** (معطى)

(الزاوية المحيطية المرسومة في نصف قطر دائرة قائمة) $\therefore \angle ACB = 90^\circ$

$\therefore \overline{AC} \perp \overline{BC}$

اي ان $\overline{CD} \perp (ABC)$

(معطى)

$\overline{AC} \perp \overline{CD}$

$\overline{AC} \perp (BCD)$

(المستقيم العمودي على مستو يكون عمودياً على جميع


المستقيمات المرسومة من أثره ضمن ذلك المستوي)

(المستقيم العمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة

تقاطعهما يكون عمودياً على مستويهما)

و. ه. م

3 مثلث ABC قائم الزاوية في B ، $\overline{AE} \perp (ABC)$ ، النقطة D منتصف \overline{CE} النقطة N منتصف \overline{AB} برهن على ان $\overline{AB} \perp \overline{ND}$



المعطيات : ABC مثلث قائم الزاوية في B ، $\overline{AE} \perp (ABC)$ ، D منتصف \overline{CE} ، N منتصف \overline{AB}

المطلوب اثباته : $\overline{AB} \perp \overline{ND}$

البرهان : لتكن M منتصف \overline{AC}

$\therefore D$ منتصف \overline{CE}

N منتصف \overline{AB} (معطى)

$$\overline{MD} \parallel \overline{AE}$$

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{AE} \perp (ABC) \text{ (معطى)}$$

$$\therefore \overline{MD} \perp (ABC)$$

(قطعة المستقيم الواصل بين منتصفي ضلعي مثلث)

توازي الضلع الثالث)

(المستوي العمودي على احد مستقيمين متوازيين يكون عمودياً على الآخر)

$$\therefore B \text{ زاوية قائمة (معطى)}$$

$$\Rightarrow \overline{AB} \perp \overline{BC}$$

(اذا كان قياس الزاوية بين مستقيمين متقاطعين 90°)

فان المستقيمين متعامدين)

$$\therefore \overline{MN} \perp \overline{AB}$$

(المستقيم العمودي على احد مستقيمين متوازيين)

$$\therefore M \in (ABC)$$

يكون عمودي على الآخر)

$$\Rightarrow \overline{MD} \perp (ABC) , \overline{MN} \perp \overline{AB} , \overline{AB} \subset (ABC)$$

$$\therefore \overline{AB} \perp \overline{ND} \text{ (مبرهنة الاعمدة الثلاثة)}$$

و . ه . م

تمارين (2-7)

1 / ABC مثلث قائم الزاوية في B ، $AB = 4\text{cm}$ ، $BC = 3\text{cm}$

رسم $\overline{CD} \perp (ABC)$ بحيث $CD = 12\text{cm}$ جد طول AD .

2 / برهن على ان المستقيمين العموديين على مستويين متقاطعين لاي توازيان.

3 / في $\triangle ABC$ ، $m\angle A = 30^\circ$ ، $\overline{BD} \perp (ABC)$ ، $BD = 5\text{cm}$ ، $AB = 10\text{cm}$

فإذا كان BH عمودي على \overline{AC} جد قياس BHD

الفصل الثامن

Chapter 8

مبدأ العد والتباديل والتوافيق Counting, Permutation and Combination

- [8-1] مبدأ العد
- [8-1-1] رمز المضروب .
- [8-2] التباديل .
- [8-2-1] قوانين التباديل .
- [8-3] التوافيق .
- [8-3-1] قوانين التوافيق .
- [8-4] عدد طرق سحب عينة عناصرها (r) من مجموعة عدد عناصرها (n) .
- [8-5] نسبة الاحتمال .
- [8-5-1] قوانين الاحتمالات .

المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
رمز مضروب n	$n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 2 \times 1$
التباديل	$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$
التوافيق	$C_r^n = \frac{P_r^n}{r!}$
نسبة الإحتمال	$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$

الفصل الثامن

Chapter 8

[8-1] مبدأ العد Counting Method

إذا أمكن إجراء عملية باحدى الطرق المختلفة عددها (m) وكان لدينا في الوقت نفسه عملية أخرى يمكن إجراؤها بطرق عددها (n) فان عدد الطرق التي يمكن بها إجراء العمليتين معاً يساوي: $m \times n$

مثال 1

يوجد لدى صاحب مخزن ثلاثة انواع من الدراجات الهوائية ومن كل نوع يوجد أربعة احجام ومن كل حجم يوجد ست دراجات فما عدد الدراجات؟

الحل:

$$\text{عدد الدراجات} = 3 \times 4 \times 6$$

$$72 = \text{دراجة}$$

مثال 2

كم عدد رمزه مكون من ثلاث مراتب يمكن تكوينه من مجموعة الارقام :
{1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 9}

أ. التكرار مسموح

ب. التكرار غير مسموح

الحل:

أ. التكرار مسموح

$$\text{عدد اختيارات الرقم الاول} = 6$$

$$\text{عدد اختيارات الرقم الثاني} = 6$$

$$\text{عدد اختيارات الرقم الثالث} = 6$$

$$\text{عدد الاعداد} = 6 \times 6 \times 6 = 216$$

ب. التكرار غير مسموح

$$\text{عدد اختيارات الرقم الاول} = 6$$

$$\text{عدد اختيارات الرقم الثاني} = 5$$

$$\text{عدد اختيارات الرقم الثالث} = 4$$

$$\text{عدد الاعداد} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

مثال 3

كم عدد رمزه مكون من رقمين وأصغر من (40) يمكن تكوينه باستخدام الأرقام :

{1 , 2 , 3 , 4 , 5}

أ. تكرار الرقم مسموح في العدد نفسه

ب. تكرار الرقم غير مسموح في العدد نفسه

الحل :

أ. عدد اختيارات رقم العشرات = 3

عدد اختيارات رقم الاحاد = 5

عدد الاعداد = $5 \times 3 = 15$

ب. عدد اختيارات رقم العشرات = 3

عدد اختيارات رقم الاحاد = 4

عدد الاعداد = $3 \times 4 = 12$

مثال 4

كم عدد رمزه مكون ثلاثة مراتب واكبر من 500 يمكن تكوينه من الأرقام

{1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7}

أ. تكرار الرقم مسموح

ب. تكرار الرقم غير مسموح

الحل :

أ. عدد اختيارات رقم المئات = 3

عدد اختيارات رقم العشرات = 7

عدد اختيارات رقم الاحاد = 7

عدد الاعداد = $7 \times 7 \times 3 = 147$

ب. عدد اختيارات رقم المئات = 3

عدد اختيارات رقم العشرات = 6

عدد اختيارات رقم الاحاد = 5

عدد الاعداد = $5 \times 6 \times 3 = 90$

[8-1-1] رمز المضروب

يظهر في احيان كثيرة في الرياضيات ضرب الاعداد الصحيحة الموجبة من العدد (n) حتى (1)

ويرمز له $n! = \underline{n}$ ويقرأ مضروب n

$$n! = n (n - 1) (n - 2) \dots 1$$

مثال 1

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

ملاحظة :

أتفق على ان :

$$1! = 1$$

وان

$$0! = 1$$

مثال 2

$$\text{اذا كان } \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30 \text{ جد قيمة } (n)$$

الحل :

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30 \quad \therefore \frac{(n+1) n (n-1)!}{(n-1)!} = 30$$

$$(n+1) n = 30$$

$$n^2 + n - 30 = 0$$

$$(n-5) (n+6) = 0$$

يهمل لان n يجب ان تكون عدد صحيح موجب $\therefore n = 5$, $n = -6$

مثال 3

إذا كان $n! = 5040$ فما قيمة n ؟

الحل :

$$\begin{aligned} n! &= 5040 \\ \therefore n! &= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ n! &= 7! \\ \therefore n &= 7 \end{aligned}$$

5040	1
5040	2
2520	3
840	4
210	5
42	6
7	7
1	

[8-2] التباديل (permutation)

يسمى وضع (n) من الأشياء في ترتيب معين بأنه تبديل لهذه الأشياء (بشرط أن تأخذ جميع هذه الأشياء) وتقرأ تبديل (n) مأخوذة منه (r) ويرمز للتباديل

$$P_r^n \text{ أو } P(n, r)$$

[8-2-1] قوانين التباديل

$$1. P_r^n = P(n, r) = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$$

$$\text{حيث } r < n$$

$$2. P_n^n = n! = n(n-1)(n-2) \dots 1$$

$$3. P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$4. P_0^n = 1$$

مثال 1

احسب p_3^8

الحل :

$$p_3^8 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 336 \quad (\text{حسب القانون الثالث})$$

ويمكن حل المثال حسب القانون الاول كما يلي : -

$$p_3^8 = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

مثال 2

احسب p_4^4

الحل :

$$p_4^4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \quad (\text{حسب القانون الثاني})$$



مثال 3

احسب p_0^5

الحل :

$$p_0^5 = 1 \quad (\text{حسب القانون الرابع})$$

ويمكن توضيح ذلك حسب القانون الثالث

$$p_0^5 = \frac{5!}{(5-0)!} = \frac{5!}{5!} = 1$$

مثال 4

جد عدد التباديل للحروف أ ، ب ، جـ المأخوذة منها أثنين في كل مرة

الحل :

$$p_2^3 = 3 \times 2 = 6$$

مثال 5

ما عدد طرق توزيع (4) اشخاص على (4) وظائف شاغرة بحيث كل شخص له فرصة عمل متساوية مع الآخرين ؟

الحل :

$$p_4^4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \quad \text{عدد الطرق}$$

مثال 6

بكم طريقة يمكن لمجموعة من سبعة اشخاص في حفل ان يرتبوا انفسهم بحيث يجلسون في صف مستقيم به سبعة مقاعد ؟

الحل :

$$p_7^7 = 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040 \quad \text{عدد الطرق}$$

مثال 7

جد قيمة (n) اذا كان $p_2^n = 90$

الحل :

$$p_2^n = 90$$

$$n(n-1) = 90$$

$$n^2 - n - 90 = 0$$

$$(n - 10)(n + 9) = 0$$

$$\Rightarrow n = 10 , n = -9 \quad \text{يهمل}$$

[8-3] التوافيق Combination

هو كل مجموعة يمكن تكوينها من مجموعة من الأشياء مأخوذة كلها أو بعضها بصرف النظر عن ترتيبها ويرمز لها

$$C_r^n = {}^nC_r = C(n, r)$$

[8-3-1] قوانين التوافيق

$$1. C_r^n = \frac{p_r^n}{r!}$$

$$2. C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}$$

$$3. C_r^n = C_{n-r}^n$$

$$4. C_n^n = C_0^n = 1$$

$$5. C_1^n = n$$

مثال 1

أحسب كل من

$$1. C_2^5 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \quad \text{حسب القانون الاول}$$

$$2. C_3^8 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

مثال 2

كم لجنة ثلاثية يمكن تكوينها من (6) أشخاص ؟

الحل:

$$C_3^6 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

مثال 3

إذا كان عدد أسئلة امتحان مادة الرياضيات هو (8) أسئلة المطلوب حل (5) أسئلة فقط. بكم

طريقة يمكن الأجابة ؟

الحل:

$$C_5^8 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 56$$

مثال 4

بكم طريقة يمكن اختبار لجنة من ثلاثة رجال وسيدتين من بين (7) رجال و (5) سيدات ؟

الحل:

يمكن اختيار ثلاثة رجال من بين سبعة رجال بطرق عددها C_3^7 ويمكن اختيار السيدتين من بين خمسة سيدات بطرق عددها C_2^5 إذن اختيار اللجنة بطرق عددها

$$C_3^7 \times C_2^5 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 350$$

رجال
7

↓
3

C_2^7

نساء
5

↓
2

C_2^5

مثال 5

كيس فيه (10) كرات حمراء و (6) كرات بيضاء سحبت منه (4) كرات معاً. ما عدد الطرق

التي تكون فيها الكرات المسحوبة من نفس اللون ؟

الحل:

$$C_4^{10} + C_4^6 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$$

$$= 210 + 15 = 225 \text{ عدد الطرق}$$

بيضاء
6

↓
0

4

حمراء
10

↓
4

0

او

مثال 6

اثبت ان :

$$\binom{70}{3} = \binom{70}{67}$$

حسب القانون الثالث

الحل:

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

$$\therefore \binom{70}{3} = \binom{70}{70-3}$$

$$= \binom{70}{67}$$

مثال 7

جد قيمة (n) اذا كان $C_2^n = 55$

الحل:

$$C_2^n = \frac{n(n-1)}{2 \times 1}$$

$$\therefore \frac{n(n-1)}{2} = 55$$

$$n(n-1) = 110$$

$$n^2 - n - 110 = 0$$

$$(n - 11)(n + 10) = 0$$

$$\Rightarrow n = 11, n = -10 \text{ يهمل}$$

[4-8] عدد طرق سحب عينة عدد عناصرها (r) من مجموعة عدد عناصرها (n)


حيث $n \in \mathbb{N}^+, n \geq 1, r \leq n$

ملاحظة:

عند السحب يجب مراعاة الآتي:

1. السحب بالارجاع يعني ان كل عينة تسحب تعاد الى المجموعة الاصلية قبل الشروع بسحب عينة اخرى.
2. السحب بدون ارجاع: يعني ان العينة التي تسحب لا تعاد مره اخرى الى المجموعة الاصلية.

والمخطط الآتي يوضح عملية السحب :-



إذا لم تذكر طريقة السحب فتعتبر دون أرجاع ولا وجود للترتيب

مثال 8

بكم طريقة يمكن سحب (3) كرات من وعاء به (7) كرات

- أ. مع الارجاع ومراعاة الترتيب
 - ب. مع الارجاع وعدم الترتيب
 - ج. دون أرجاع ومراعاة الترتيب
 - د. دون أرجاع وعدم مراعاة الترتيب
- الحل:

أ. عدد الطرق

$$n^r = 7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343$$

ب. عدد الطرق

$$C_r^{n+r-1} = C_3^{7+3-1} = C_3^9 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$$

ج. عدد الطرق

$$P_3^7 = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

د. عدد الطرق

$$C_3^7 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

تمارين (1-8)

1. في معرض للسيارات توجد (5) أنواع من السيارات ومن كل نوع (3) نماذج ومن كل نموذج توجد (4) سيارات فما عدد السيارات في المعرض ؟

2. كم عدد زوجي يمكن تكوينه من أربع مراتب مأخوذة من الأرقام { 5,1,6,2,7,4,8 }
 أ. التكرار مسموح به في العدد نفسه .
 ب. التكرار غير مسموح به في العدد نفسه .

3. صندوق يحتوي على عشرة مصابيح (4) منها عاطلة سحبت ثلاثة مصابيح جد عدد طرق سحب
 أ. أثنان صالحة وواحد عاطل .
 ب. على الأقل مصباح صالح.

4. إذا كان عدد أسئلة أمتحان مادة ما هو (8) أسئلة وكان المطلوب حل خمسة أسئلة منها فقط بشرط أن تكون ثلاثة منها من الأسئلة الأربعة الأولى. فبكم طريقة يمكن الإجابة؟

5. ما عدد الطرق لاختيار فريق لكرة الطائرة من (6) لاعبين من بين (11) لاعب. [الاختيار دون أرجاع وعدم مراعاة الترتيب]

6. كم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص على شرط أن تحتوي على (3) طلاب و (2) طالبة من بين (7) طلاب و (6) طالبات

أ. استبعاد أحد الطلاب من اللجنة
 ب. إحدى الطالبات لا يحق لها المشاركة في اللجنة.

7. جد قيمة (n) إذا كان

1. $P_2^n = 72$ 2. $(n_2) = 10$ 3. $2(n_2) = (3^{n+1})$

8. كم عدد رمزه مكون من ثلاثة مراتب واصغر من 600 يمكن تكوينه من الأرقام { 5 , 3 , 6 , 2 , 7 , 9 }

أ. يسمح بتكرار الرقم في العدد نفسه.
 ب. لا يسمح بتكرار الرقم في العدد نفسه.

9. إذا كان $x = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ فكم عدد رمزه مكون من (5) أرقام مختلفة يمكن تكوينه من عناصر x؟

نبذة تاريخية :-

في منتصف القرن السابع عشر ومن خلال الابحاث التي قام بها كل من باسكال (pascal) وفيرمات (Fermat) عند دراستهم لأرقام معينة في عالم المراهنة نشأت ((نظرية الاحتمالات)) واصبحت الآن تكتسب اهمية كبيرة في مجالات متعددة مثل الارصاد الجوية ، العلوم الهندسية ، التأمين ، الطب الحيوي حيث نظرية الوراثة تعتبر افضل تطبيق لنظرية الاحتمالات في هذا المجال والتي جاءت عن طريق (العالم مندل) .

بعض المفاهيم الاساسية :

- 1 - التجربة (Experiment) : هو القيام بفعل معين ثم ملاحظة جميع ما ينتج عن هذا الفعل .
- 2 - التجربة العشوائية (Random Experiment) : وهي التجربة التي تحقق الشرطين التاليين:-
أ. يمكن لنا ان نصف جميع نواتج التجربة قبل وقوعها
ب. لا يمكن تحديد اي من النواتج ، يمكن ان يتحقق فعلاً في حالة حدوث التجربة

مثال 1

رمي حجر النرد (Dice) مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهري ، نعلم مسبقاً ان الوجه الظاهري في الرمية سيكون احد الارقام 1,2,3,4,5,6 اي يمكن تحديد جميع النتائج الممكنة لكن من غير الممكن تحديد النتيجة بعينها لذا سميت هذه التجربة بالتجربة العشوائية

فضاء العينة sample spaces

فضاء العينة في تجربة عشوائية هو جميع النتائج الممكنة لهذه التجربة ويرمز له S يرمز الى عدد عناصر الفضاء بالرمز $n(s)$

ففي المثال الاول السابق

فضاء العينة $s = \{1,2,3,4,5,6\}$

عدد عناصر الفضاء $n(s) = 6$

الحدث (Event)

هو مجموعة جزئية من فضاء العينة A ، حدث من فضاء العينة $S \Rightarrow A \subseteq S$

الاحداث الشاملة

لتكن A , B , C أحداث من فضاء العينة S يقال لهذه الاحداث شاملة اذا حققت الشروط التالية:

1. اتحاد الاحداث $S =$ فضاء العينة
2. تقاطعها مثنى مثنى (كل اثنين منهما) $= \emptyset$
3. كل مجموعة منها ليست خالية

مثال 2

ليكن $S = \{1,2,3,4,5,6\}$ نأخذ بعض الاحداث من

$A_1 = \{4,1\}$ حدث مركب (Compound Event)

لان عدد عناصره اكبر من (1)

$A_2 = \{3\}$ حدث بسيط (Simple Event)

لان عدد عناصره = 1

$A_3 = \{6\}$ بسيط

$A_4 = \{1,2,3,4,5\}$ مركب

$A_5 = \emptyset$ = عدد يقبل القسمة على 2,5 في نفس الوقت $\Leftrightarrow A_5 = \emptyset$

$A_5 =$ حدث مستحيل (Impossible Event)

$A_6 = \{5,2\}$ مركب

$A_7 = \{6,5,3,2\}$ مركب

$A_8 = S$ لان $A_8 = \{1,3,4,2,5,6\}$ حدث مؤكد (Sure Event)

نلاحظ A_1, A_7 احداث شاملة من S

العمليات على الحوادث

1. $A \subseteq S$ معناه A حدث من S
2. \emptyset تسمى بالحدث المستحيل (الحدث الذي لا يمكن وقوعه)
3. S فضاء العينة = الحدث المؤكد ((يقع دائماً))
4. $A^c = S - A$ يسمى الحدث المكمل للحدث A (او عدم وقوع الحدث A)
 $A^c = \text{Complement Event}$
5. $B \cup A$ يعني حدث وقوع الحدث A أو B اي حدث وقوع احد الحدثين على الاقل .
6. $B \cap A$ يعني حدث وقوع الحدث A و B اي حدث وقوع الحدثين معاً
7. $A \subseteq B$ يعني حدث وقوع الحدث A يستلزم وقوع الحدث B
8. Mutually Exclusive Events $A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$ حدثين متنافيين
9. الحدث الذي يتكون من عنصر واحد يسمى حدث بسيط.
10. الحدث الذي يتكون من عنصرين او اكثر يسمى حدث مركب.

ملاحظة :

إذا كانت تجربة مركبة من تجربتين متتاليتين وكان فضاء العينة الاولى s_1 والثانية s_2 فإن

$$1 \text{ فضاء العينة للتجربة المركبة } = s_2 \times s_1 \text{ (حاصل ضرب ديكارتي)}$$

$$2 \text{ } n(s_2) \times n(s_1) = n(s) \text{ ((مبدأ العد))}$$

مثال 3

التجربة : القاء حجر نرد ثم قطعة نقود ثم حجر نرد مرة اخرى التجربة هنا مركبة من التجارب

الثلاث الاتية :

الحل:

$$s_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ حجر النرد الاول}$$

$$s_2 = \{H, T\} \text{ حيث الصورة } H = (\text{Head}) , \text{ الكتابة } T = (\text{Tail})$$

$$s_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ حجر النرد الثاني}$$

$$\text{فإن } s = s_1 \times s_2 \times s_3 \text{ (يمثل فضاء العينة للتجربة المركبة)}$$

$$\therefore \text{ عدد عناصر فضاء العينة للتجربة المركبة } n(s) = n(s_1) \times n(s_2) \times n(s_3)$$

$$n(s) = 6 \times 2 \times 6 = 72 \text{ ثلاثي مرتب}$$

تمارين (2-8)

1. رمينا حجرين من احجار النرد جد
 - أ. عدد عناصر فضاء العينة $n(s)$.
 - ب. اكتب فضاء العينة s .
 - ج. اكتب الحدث الذي قيمة مجموع العددين على وجهي الحجرين اكبر او يساوي 9 .
 - د. اكتب الحدث الذي قيمة مجموع العددين على وجهي الحجرين يقبل القسمة على 6 بدون باقٍ.
 - هـ. اكتب الحدث الذي قيمة العدد الذي على وجه احد الاحجار ضعف العدد الذي على وجه الحجر الاخر .
2. من رمي حجر نرد مرة واحدة اكتب الاحداث الاتية ثم بين اي الحدثين منهما متنافيين
 - أ. الحدث ظهور عدد اولي
 - ب. الحدث ظهور عدد زوجي
 - ج. الحدث ظهور عدد فردي
3. رميت ثلاث قطع نقود مرة واحدة
 - أ. صف فضاء العينة
 - ب. جد الحدث وجه واحد على الاقل صورة (H)
 - ج. ظهور على الاكثر كتابة (T)

ليكن A حدث من s حيث s فضاء ذي احتمالات متساوية فضاء منتظم $uniform spaces$

[8-5] نسبة الاحتمال Probability Ratio

P = الاحتمال

نسبة احتمال حدوث الحدث A = عدد عناصر A / عدد عناصر الفضاء

$$p(A) = n(A) / n(s)$$

[8-5-1] قوانين الاحتمالات :

ليكن كل من A, B حدثين من s

$$0 \leq p(A) \leq 1 \quad \text{حيث} \quad (1)$$

$P(A) = 0$ اذا كان A حدثاً مستحيلاً

$P(A) = 1$ اذا كان A حدثاً مؤكداً

اي ان نسبة احتمال اي حدث تنتمي للفترة المغلقة $[0, 1]$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad \text{حدثان مستقلان (احتمال حدوث اي منهما لا يشترط حدوث الآخر)} \quad (2)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (3)$$

اذا كان $A \cap B = \emptyset$ يكون :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A) + P(A^c) = 1 \quad (4)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) \quad \text{اي:}$$

مثال 1

اقراص مرقمة من 10 الى 21 سحب منها قرص واحد جد نسبة احتمال ان هذا القرص يحمل عدد زوجياً او عدد يقبل القسمة على (3) بدون باقٍ

الحل :

$$S = \{ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21\}$$

$$n(s) = 21 - 10 + 1 = 12 \quad \text{ويمكن عدّها}$$

$$n(A) = 6 \quad \text{ليكن } A \text{ حدث يحمل عدداً زوجياً} \Leftrightarrow$$

$$P(A) = n(A) / n(s) = 6/12$$

ليكن B حدث للعدد يقبل القسمة على 3 بدون باقٍ

$$B = \{12,15,18,21\}$$

$$P(B) = n(B) / n(s) = 4 / 12$$

$$A \cap B = \{ 12,18 \} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{12}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ = 6/12 + 4/12 - 2/12 = 8/12 = 2/3$$

مثال 2

شركة افرادها هم 60 رجلاً و 20 امرأة ، من الرجال 35 رجل متزوج ومن النسوة 12 متزوجة من هذه الشركة اختبر شخص واحد عشوائياً جد احتمال ان يكون :

1. هذا الشخص رجل

2. هذا الشخص امرأة غير متزوجة

الحل :

1. ليكن A الحدث ((الشخص رجل))

$$n(s) = 60 + 20 = 80$$

$$P(A) = 60 / 80 = 3/4$$

2. ليكن B الحدث ((الشخص امرأة غير متزوجة))

$$P(B) = 8 / 80 = 1/10$$

مثال 3

القينا حجرين مرة واحدة جد احتمال ان يكون مجموع العددين على الوجهين الظاهرين يساوي 10 او مجموع العددين على الوجهين الظاهرين 9

الحل :

$$n(s) = 6 \times 6 = 36$$

ليكن $A =$ الحدث : مجموع العددين على الوجهين الظاهرين $= 10$

$$A = \{(5,5), (4,6), (6,4)\} \Rightarrow n(A) = 3$$

$$P(A) = n(A) / n(s) = 3 / 36$$

ليكن $B =$ الحدث : مجموع العددين على الوجهين الظاهرين $= 9$

$$B = \{(4,5), (5,4), (3,6), (6,3)\} \Rightarrow n(B) = 4$$

$$P(B) = 4 / 36, A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= 3 / 36 + 4 / 36 = 7 / 36$$

مثال 4

رمينا حجرين متمايزين من احجار النرد مرة واحدة ما احتمال ان يكون العدد علي وجه احد الحجرين هو ضعف العدد على الوجه الاخر أو العددين على الوجهين الظاهرين مجموعهما $= 6$

الحل :

لتكن $A =$ الحدث: العدد على الوجه الظاهري لأحد الحجرين ضعف العدد على الوجه الآخر

$$A = \{(3,6), (6,3), (2,4), (4,2), (1,2), (2,1)\}$$

$$n(A) = 6$$

$$P(A) = n(A) / n(s) = 6 / 36$$

ليكن $B =$ الحدث : مجموع العددين على الوجهين $= 6$

$$B = \{(3,3), (2,4), (4,2), (1,5), (5,1)\}$$

$$P(B) = n(B) / n(s) = 5 / 36$$

$$A \cap B = \{(2, 4), (4, 2)\}$$

$$P(A \cap B) = 2/36$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{6}{36} + \frac{5}{36} - \frac{2}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

مثال 5

ليكن احتمال نجاح طالب في امتحان الرياضيات هو 90 % وليكن احتمال نجاح طالب آخر في الرياضيات هو 70 % جد نسبة احتمال نجاحهما معاً في امتحان الرياضيات .

الحل :

ليكن $P(A)$ نسبة احتمال نجاح طالب الاول في الرياضيات

$$\therefore P(A) = 0.90$$

ليكن $P(B)$ نسبة احتمال نجاح طالب اخر في الرياضيات

$$\therefore P(B) = 0.70$$

من الواضح ان A , B حدثين مستقلين (لان نجاح احدهما لا يتأثر بنجاح الاخر)

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= 0.90 \times 0.70 = 0.63$$

مثال 6

صندوق يحتوي 8 اقراص بيضاء ، 4 اقراص حمراء ، 3 اقراص خضراء سحبنا (3) اقراص مرة واحدة جد نسبة احتمال الاقراص المسحوبة من نفس اللون


الحل :

$$n = 8+4+3 = 15$$

$$r = 3$$

$$P = (C_3^8 + C_3^4 + C_3^3) / C_3^{15}$$

$$= \frac{61}{455}$$



مثال 7

يراد تكوين لجنة من 5 أشخاص من بين 8 طلاب و 6 طالبات

1. جد نسبة احتمال اللجنة جميعها من الطلاب

2. جد نسبة احتمال اللجنة جميعها من الطالبات

الحل :

$$n(s) = C_5^{14}$$

1. نفرض نسبة احتمال اللجنة جميعها طلاب $P(A)$

$$P(A) = C_5^8 / C_5^{14} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 / 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 = \frac{4}{143}$$

2. نفرض نسبة احتمال اللجنة جميعها طالبات $P(B)$

$$P(B) = C_5^6 / C_5^{14} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 / 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 = \frac{3}{281}$$

تمارين (3-8)

1. صندوق يحتوي ثلاث كرات بيضاء مرقمة بالأرقام من 1 ، 2 ، 3 وكرتين سوداويتين مرقمتين 1 ، 2 إذا علمت أن الكرات متماثلة بالحجم سحبت كرة واحدة جد احتمال
 - أ. الكرة سوداء. ب. الكرة بيضاء. ج. الكرة بيضاء وتحمل رقم فردي
2. رميت حجرين متمايزين من أحجار النرد:
 - أ. ماهو احتمال العددين الظاهرين مجموعهما 6
 - ب. ماهو احتمال الحصول على مجموع 7 او مجموع 11
3. صندوقان يحتوي كل منهما على 6 كرات بيضاء و 4 حمراء، جد نسبة احتمال سحب 3 كرات بيضاء من الصندوق الاول، وسحب كرتين بيضاويتين وكرة حمراء من الصندوق الثاني.
4. لدينا 5 بطاقات مرقمة من 1 الى 5 سحبت بطاقة واحدة جد نسبة احتمال البطاقة لا تحمل رقم 3.
5. كيس يحتوي على 20 كرة متجانسة في جميع عناصرها مرقمة من 1 ... 20 سحبت كرة واحدة. جد:
 - أ. احتمال العدد الذي تحمله الكرة عدداً اصغر من 9.
 - ب. احتمال العدد الذي تحمله الكرة عدداً اكبر من 5.
6. صندوق يحتوي على 21 قرص مرقم من 1 ... 21 سحب قرصان جد نسبة احتمال:
 - أ. القرصان زوجيان.
 - ب. الاول زوجي والآخر فردي.
7. لدينا 50 بطاقة مرقمة من 1 ... 50 جد احتمال العدد على البطاقة المسحوبة:
 - أ. يقبل القسمة على 5.
 - ب. يقبل القسمة على 7.
 - ج. يقبل القسمة على 5 أو 7
8. يراد اختيار لجنة طلابية تتكون من ثلاث اشخاص بين 12 طالب و 4 طالبات. ما احتمال كل مما يأتي:
 - أ. ان تكون اللجنة جميعها طلاب.
 - ب. ان يكون في اللجنة طالب واحد فقط.
9. رميت حجري نرد متمايزان مرة واحدة ما احتمال ان يكون مجموع العددين الظاهرين 9 أو يساوي 11

Chapter 9

المصفوفات Matrices

- [9-1] تعريف المصفوفة .
- [9-2] تعريف .
- [9-3] تعريف [تساوي مصفوفتين] .
- [9-4] بعض المصفوفات الشهيرة .
- [9-5] جمع المصفوفات وضربها بعدد حقيقي .
- [9-5-1] تعريف [ضرب مصفوفة في عدد حقيقي] .
- [9-6] نظير المصفوفة بالنسبة لعملية الجمع .
- [9-7] النظير الضربي للمصفوفة .
- [9-8] تعريف محدد المصفوفة .
- [9-9] تعريف .
- [9-10] حل معادلات الدرجة الأولى في مجهولين باستخدام المصفوفات .
- [9-11] محددات الرتبة الثانية باستخدامها في حل معادلات المجهولين .

المصطلح	الرمز أو العلاقة الرياضية
المصفوفة A	$A = [a_{ij}]$
محدد المصفوفة A	$\Delta A = a_{ij} $
النظير الجمعي للمصفوفة A	$-A$
النظير الضربي للمصفوفة A	A^{-1}
طريقة كرامر في حل معادلتين	$x = \frac{\Delta x}{\Delta}, y = \frac{\Delta y}{\Delta}$

الفصل التاسع

Matrices المصفوفات

Determinats المحددات

الفصل التاسع

أولاً : المصفوفات Matrices

مقدمة :

التعريف العام للمصفوفة : المصفوفات جمع كلمة مصفوفة وهي مفهوم رياضي يؤدي دوراً هاماً في معظم فروع المعرفة ، وقد لوحظت المصفوفات لأول مرة واستعملت من قبل العالم كيلى (1821 - 1895) وتستخدم المصفوفات في الوقت الحاضر من قبل المختصين في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس . هذا فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه في الرياضيات وخاصة فيما يسمى بالجبر الخطي ولها تطبيقات أخرى لاغنى عنها في الفيزياء والكيمياء وسائر العلوم التطبيقية .

نفرض أن أربعة طلاب **A, B, C, D** كانت درجاتهم في إختبار مادة الرياضيات هي على الترتيب **94, 82, 73, 60** وفي الفيزياء **75, 84, 68, 87** على الترتيب .

فيمكن تنظيم هذه المعلومات في جدول مستطيل يتكون من صفين وأربعة أعمدة كالآتي :

A	B	C	D	
94	82	73	60	الرياضيات
75	84	68	87	الفيزياء

إن الصف الأول في هذا المستطيل يعبر عن درجات الطلاب في الرياضيات والصف الثاني يعبر عن درجات الطلاب في الفيزياء كما أن العمود الأول يعبر عن درجات الطالب في المادتين معاً والعمود الثاني يعبر عن درجات الطالب في المادتين معاً وهكذا الطالبين .

ويمكن كتابة الجدول السابق على الصورة :

$$\begin{bmatrix} 94 & 82 & 73 & 60 \\ 75 & 84 & 68 & 87 \end{bmatrix}$$

شكل (1- 9)

$$\text{او} \begin{pmatrix} 94 & 82 & 73 & 60 \\ 75 & 84 & 68 & 87 \end{pmatrix}$$

شكل (2- 9)

وسنختار في هذا الكتاب الشكل (1)

١٠. مثل هذا الجدول (الترتيب) اي الشكل رقم (10-1) يسمى مصفوفة (Matrix).

نأخذ المثال التالي : جدول الضرب:

1	2	3	4	5	6
2	4	6	8	10	12
3	6	9	12	15	18
4	8	12	16	20	24

إن هذا الجدول له اربعة صفوف وستة اعمدة وكل عنصر (عدد) في هذا الجدول يتحدد (بتعین) موقعه بالصف والعمود . فمثلاً (15) يقع في الصف الثالث والعمود الخامس ، بينما (16) يقع في الصف الرابع والعمود الرابع .

تعريف (1 - 9) :

المصفوفة عبارة عن تنظيم عددي مؤلف من $m \times n$ عنصراً (Element) مرتبة في جدول مستطيل مكون من m صفاً ، n عموداً ، $m, n \in N^+$

تعريف (2 - 9) :

نقول عن المصفوفة انها من النوع $m \times n$ وتقرأ m في n اذا كانت تحتوي صفوفاً (Rows) عددها m وأعمدة Columns عددها n كما نقول أحياناً واختصاراً إنها مصفوفة $m \times n$ ، $m, n \in N^+$

سنرمز للمصفوفة بحرف مثل : A, B, C

خشية الالتباس بين المصفوفة وعناصرها كما يجب الانتباه أن عناصر أي مصفوفة في هذا الكتاب تنتمي الى حقل الاعداد الحقيقية R .

مثال 1

إن كلاً من التنظيمات العددية الآتية هي عبارة عن مصفوفات :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

لاحظ المصفوفة A هي عبارة عن ستة عناصر مرتبة في صفين وثلاثة اعمدة، ان عناصر الصف الاول هي 1، 2، 3، وعناصر الصف الثاني هي 7، 0، -1 وعناصر العمود الثالث هي 3، 7.

وحسب تعريف (10 -1) نقول أن A مصفوفة من النوع 2×3 حيث $m = 2$ ،
 $n = 3$ وإن B مصفوفة من النوع 3×2 حيث $m = 3$ ، $n = 2$ ،
 وإن C مصفوفة من النوع 2×2 حيث $m = 2$ ، $n = 2$ ،
 أما E مصفوفة من النوع 3×4

وبصفة عامة اذا كانت A مصفوفة من النوع $m \times n$ فاننا نكتب A على الصورة :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, m \\ j = 1, 2, \dots, n \end{matrix}$$

إن a_{ij} يمثل عنصراً اختيارياً (عاماً) في A حيث يرمز i الى ترتيب الصف الذي يقع فيه العنصر بينما يرمز j الى ترتيب العمود الذي يقع فيه هذا العنصر وبذلك بتعيين العنصر a_{ij} تماماً بمعرفة قيمتي j و i معاً .

مثال 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{إذا كانت}$$

عين قيم جميع العناصر a_{ij}

الحل:

بما ان المصفوفة من النوع 2×3 فان :

$i = 1, 2$ بينما $j = 1, 2, 3$ وبالتالي فان a_{ij} له ست قيم هي :

a_{11} (يمثل العنصر في الصف الاول والعمود الاول) $= 1$
 a_{12} (يمثل العنصر في الصف الاول والعمود الثاني) $= -1$

وبالمثال $a_{13}=2$, $a_{21} = -4$, $a_{22}=1$, $a_{23}=5$

تساوي مصفوفتين :

تعريف (3-9) :

- نقول ان المصفوفتين A, B متساويتان ونكتب $A=B$ اذا تحقق الشرطان الاتيان معاً :
1. A, B من نوع واحد اي ان عدد صفوف A يساوي عدد صفوف B وعدد اعمدة A يساوي عدد اعمدة B .
 2. $a_{ij} = b_{ij}$ لجميع قيم i و j الممكنة حيث i و j عدنان طبيعيين موجبان

مثال 3

عين جميع عناصر المصفوفة $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$ اذا علمت ان

$$A = B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 6 \\ -3 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

الحل :

من تعريف تساوي مصفوفتين نجد ان :

$$a_{11}=2, \quad a_{12}=-1, \quad a_{13}=6, \quad a_{21}=-3, \quad a_{22}=0, \quad a_{23}=-4$$

[4 - 9] بعض المصفوفات الشهيرة :

- المصفوفة المستطيلة **Rectangular Matrix** : هي مصفوفة من نوع $m \times n$ حيث $m \neq n$ وعندما $m=1$ تسمى (مصفوفة الصف **Row Matrix**) من النوع $1 \times n$ وعندما $n=1$ تسمى (مصفوفة العمود **Column Matrix**) من النوع $m \times 1$
- المصفوفة المربعة (**Square Matrix**) : وهي مصفوفة من النوع $n \times n$ اي ان عدد صفوفها = عدد اعمدتها.
- المصفوفة القطرية (**Diagonal Matrix**) : وهي مصفوفة مربعة جميع عناصرها أصفار ما عدا العناصر الواقعة على القطر الاساس فيكون احدها على الاقل مغايراً للصفر .
- مصفوفة الوحدة (**Unit Matrix**) : وهي مصفوفة قطرية يكون فيها كل من العناصر الواقعة على القطر الاساس مساوياً للواحد .

المصفوفة الصفرية (Zero Matrix): وهي مصفوفة $m \times n$ وجميع عناصرها اصفار وسنرمز لها بالرمز (0)

مثال 4

أ. المصفوفة $m=2$, $n=3$ مستطيلة فيها

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

ب. المصفوفة $m=1$, $n=3$ مصفوفة صف فيها

$$\begin{bmatrix} 12 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

ج. المصفوفة $m=3$, $n=1$ مصفوفة عمود فيها

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

د. المصفوفة 3×3 مربعة قطرها الاساس 3, 2, 6

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 6 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

وقطرها الثانوي الآخر 5, 2, 1

هـ. المصفوفة 3×3 قطرية عناصر قطرها 1, -1, 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

و. كل من المصفوفات: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ هي مصفوفة وحدة

ز. كل من المصفوفات: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

هي مصفوفة صفرية لاحظ أن كل واحدة تختلف عن الأخرى فمثلاً :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{2 \times 1} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}_{1 \times 2}$$

لأن الأولى من النوع 2×1 بينما الثانية من النوع 1×2

[9 - 5] جمع المصفوفات وضربها في عدد حقيقي:

تعريف: (4 - 9)

إذا كانت $A = [a_{ij}]$ ، $B = [b_{ij}]$ مصفوفتين كل منها $m \times n$

فان مجموعهما هو المصفوفة

$$C = [c_{ij}] \text{ حيث } c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

ان هذا التعريف يعني أننا نستطيع جمع أي مصفوفتين A, B إذا وفقط إذا كانتا من النوع $m \times n$ نفسه وحينئذ يمكننا ان نكتب مجموعها بالصورة :

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

مجموع العنصرين المتناظرين بالوضع في A, B

مثال 5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ إذا كانت}$$

فأوجد : $A+B$, $B+A$, $A+A$

$$A+B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B+A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 3 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A+B = B+A$$

$$A+A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 10 & -12 & 2 \end{bmatrix}$$

لاحظ ان $2A$ تمثل ضرب كل من عنصر في A بالعدد (2) .

تعريف : (5-9)

إذا كانت $A = [a_{ij}]$ مصفوفة $m \times n$ وكانت $K \in R$ فان حاصل ضرب المصفوفة A بالعدد الحقيقي k هو المصفوفة $C = [c_{ij}]$ حيث $c_{ij} = Ka_{ij}$ لجميع قيم ij الممكنة
اي ان : $KA = [ka_{ij}]$

مثال 6

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ فجد المصفوفة $k.A$ عندما تكون :

ج $K = -1$

ب $k = \frac{1}{2}$

أ $k = 2$

الحل :

أ $kA = 2A = 2 \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 4 & 8 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

ب $k.A = \frac{1}{2} A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$$k A = (-1) A = (-1) \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{جـ}$$

[9 - 6] نظير المصفوفة بالنسبة لعملية الجمع :



تعريف : (9 - 6)

إذا كانت A, B مصفوفتين من النوع $m \times n$ فإن :

$$A - B = A + (-1)B$$

مثال 7

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ -6 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{إذا كانت :}$$

فجد كلاً من $A - B$, $B - A$ وتحقق أنهما غير متساويين :

الحل :

$$A - B = A + (-1)B$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ -6 & 1 & 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ -6 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & -7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -6 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B - A = B + (-1)A$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 3 & -3 & 5 \\ -6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 3 & -5 \\ 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 & -2 \\ 6 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A - B \neq B - A$$

خواص جمع المصفوفات :

إذا كانت H مجموعة المصفوفات من النوع $m \times n$ فان النظام $(H, +)$ حيث $(+)$ عملية جمع المصفوفات يتمتع بالخواص الآتية :

1. العملية $(+)$ ثنائية على H : لأنه

$$\forall A, B \in H$$

فان $A + B \in H$

2. العملية $(+)$ إبدالية :

$$\forall A, B \in H$$

فان $A + B = B + A$

3. العملية $(+)$ تجميعية :

$$\forall A, B, C \in H$$

فان $(A+B) + C = A + (B + C)$

4. يوجد في H عنصر محايد هو المصفوفة الصفرية (0) لأنه

$$\forall A \in H$$

فان $0 + A = A + 0 = A$

5. لكل مصفوفة A تنتمي الى H يوجد مصفوفة

$$B = (-1) A \in H$$

بحيث $A + B = 0$

ملاحظة: إن تحقيق الخواص السابقة يمكن إيجازها في قولنا [أن النظام $(H, +)$ زمرة إبدالية]

خواص ضرب عدد حقيقي بمصفوفة :

إذا كانت A, B مصفوفتين من النوع $m \times n$ وكان $K, L \in \mathbb{R}$ فإن :

1. $K(A + B) = K \cdot A + K \cdot B$
2. $(K+L) \cdot A = K \cdot A + L \cdot A$
3. $K \cdot (L \cdot A) = (K \cdot L) \cdot A$
4. IF $K \cdot A = 0 \Leftrightarrow K = 0$ OR $A = 0$
5. IF $K \cdot A = K \cdot B$ حيث $K \neq 0 \Rightarrow A = B$
6. $1 \cdot A = A$

مثال 8

إذا كانت $A, B, C \in H$

حيث H مجموعة المصفوفات من النوع $m \times n$ فجد C التي هي حل المعادلة

$$C + B = A$$

الحل :

بإضافة المصفوفة $-B$ الى الطرفين :

$$C + B + (-B) = A + (-B)$$

خاصية التجميع في المصفوفات $C + (B - B) = A - B$

خاصية العنصرين المتناظرين $\Rightarrow C + 0 = A - B$

خاصية العنصر المحايد . $\Rightarrow C = A - B$

ملاحظة :

إن $-B$ هي النظير الجمعي للمصفوفة B وهو نظير وحيد والعنصر المحايد 0 وحيد

وبالتالي يكون $C = A - B$ حلاً وحيداً للمعادلة .

مثال 9

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$$

فجد حل المعادلة $C + B = A$ وتحقق من صحة الناتج .

الحل :

$$C = A - B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

التحقيق : نحقق قيمة C في المعادلة :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = A$$

مثال 10

حل المعادلة المصفوفية الآتية :


$$-3 \left(C - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right) = (-4) C + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(-3) C + (-3)(-1) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = (-4) C + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(-3) C + \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = (-4) C + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$4C + (-3)C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$



تمارين (9 - 1)

1. جد قيم h, z, y, x اذا كان :

$$\begin{bmatrix} x-2 & 2y+1 \\ x+3 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ z & 3h-2 \end{bmatrix}$$

أ

$$\begin{bmatrix} 3x & 10 \\ 2x+z & 2y-h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 2y \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$$

ب

2. اجر العمليات الاتية ان امكن ، مع ذكر السبب في حالة تعذر اجراء العملية :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

أ

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$$

ب

$$\begin{bmatrix} 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ج

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$$

د

3. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ فجد المصفوفة $k.A$ عندما تكون :

أ. $k=1$ ، ب. $k=\frac{2}{5}$ ، ج. $k=0$ ، د. $k=-1$ ، هـ. $k=2$

4. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix}$ ، $C = \begin{bmatrix} 0 & -5 \end{bmatrix}$ فعبّر عن كل مما يأتي كمصفوفة

أ. $A + (B+C)$ ، ب. $2A + B + C$

5. باستعمال المصفوفات A ، B ، C الواردة في التمرين (4) حل كلاً من المعادلات المصفوفية الآتية :

أ. $A + X = B + C$

ب. $2(B - C) = 2(X - C) - B$

ج. $\frac{1}{2}(A + X) = 3X + 2B$

ضرب المصفوفات Multiplication Of Matrices :

سنوضح ضرب المصفوفات من خلال الامثلة الآتية:

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

فان حاصل ضرب $A \times B$ يعرف كما يلي :

$$1. A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 4 + 3(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 8 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

فان $A \times B$ يعرف كما يلي

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 5 + 3 \times 4 & 1 \times (-1) + 3 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & -1 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

فان $A \times B$ يعرف كما يلي:

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 \times (-1) + (-1) \times 0 + 3 \times 1 \\ 2 \times (-1) + 0 \times 0 + 1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

فان $A \times B$ يعرف كما يلي:

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 0 \times 5 + 1 \times (-1) & 2 \times 3 + 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 1 \times 1 + (-1) \times 5 + 3 \times (-1) & 1 \times 3 + (-1) \times 1 + 3 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$$

ملاحظة :

شروط ضرب $A \times B$ هي:

أ. أعمدة A = صفوف B

ب. اذا كانت A من النوع $m \times L$ ، وكانت B من النوع $L \times n$ فان حاصل الضرب $A \times B$

تكون مصفوفة من النوع $m \times n$

ج. اذا كانت A, B مصفوفتين مربعيتين $m \times m$ فان كلا من AB , BA مصفوفة مربعة $m \times m$

وبصفة خاصة اذا كانت $A=B$ فسنكتب AA بالصورة A^2 اي ان $A^2 = AA$

مثال 1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

اذا كانت

فجد ان امكن :

$$A \times B \quad B \times A \quad A^2 \quad B^2$$

الحل : بما ان عدد اعمدة A = عدد صفوف B فان $A \times B$ يمكن ايجادها :

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 6 \\ 14 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$

لا يمكن إيجاد $A \times B$ لأن اعمدة $B \neq$ صفوف A

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -21 \\ 28 & 13 \end{bmatrix}$$

$$B^2 = B \times B$$

لا يمكن إيجادها لأن اعمدة $B \neq$ صفوف B حيث

مثال 2

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

فأثبت أن عملية ضرب المصفوفة غير إبدالية .

الحل :

$$A \times B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 25 \\ 12 & 20 \end{bmatrix}$$

$$B \times A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 9 & 35 \end{bmatrix}$$

من الواضح أن $A \times B \neq B \times A$

مثال 3

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فأثبت أن $A \times I = I \times A$ وماذا تستنتج من ذلك ؟

الحل :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = A$$

كذلك $I \times A = A$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ نستنتج ان}$$

مصفوفة محايدة بالنسبة لعملية ضرب المصفوفة المربعة من النوع 2×2

مثال 4

إذا علمت ان

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

فجد كلاً من x , y , z

الحل :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times (-2) + (-1) \times 3 \\ 0 \times 1 + (-2)(-2) + 3 \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times (-2) + 0 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 13 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = -2 , \quad y = 13 , \quad z = 0$$

مثال 5

إذا علمت ان A مصفوفة من النوع 2×3 ، B مصفوفة من النوع 3×2 فجد نوع كل من

المصفوفات الآتية :

$$(B \times A) \times B \quad (A \times B) \times A \quad B \times A \quad A \times B$$

الحل :

$$\begin{array}{llll} \text{مصفوفة } 2 \times 2 & A \times B & \Leftarrow & \text{مصفوفة } 3 \times 2 \quad B \quad , \quad \text{مصفوفة } 2 \times 3 \quad A \\ \text{مصفوفة } 3 \times 3 & B \times A & \Leftarrow & \text{مصفوفة } 2 \times 3 \quad A \quad , \quad \text{مصفوفة } 3 \times 2 \quad B \\ \text{مصفوفة } 2 \times 3 & (B \times A) \times A & \Leftarrow & \text{مصفوفة } 2 \times 3 \quad A \quad , \quad \text{مصفوفة } 2 \times 2 \quad (A \times B) \\ \text{مصفوفة } 3 \times 2 & (B \times A) \times B & \Leftarrow & \text{مصفوفة } 3 \times 2 \quad B \quad , \quad \text{مصفوفة } 3 \times 3 \quad (B \times A) \end{array}$$

مثال : 6

إذا كانت

$$A^2 - 3A + 2I = 0 \text{ فاثبت ان } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل :

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 3A + 2I = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{الطرف الاول}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & -9 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 = \text{الطرف الثاني}$$

تمارين (9 - 2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. إذا كانت :

فجد

$$C \times A \quad B \times A \quad B \times C \quad A \times C \quad A \times B$$

$$A \times (B \times C) \quad (A \times B) \times C \quad C \times B$$

2. إذا كانت A, B, C كما في التمرين السابق وكانت I مصفوفة الوحدة فاثبت ان :

$$B^2 = -I \quad A^2 = C^2 = I \quad A \times B = -(B \times A)$$

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

3. إذا كانت A مصفوفة 3×2 و B مصفوفة 3×3 و C مصفوفة 4×3

و D مصفوفة 3×2 . فبين نوع كل من المصفوفات الآتية :

$$B \times D \quad C \times B \quad A \times D \quad D \times A \quad A \times B$$

$$(A \times D) \times A \quad (C \times B) \times D \quad D \times (A \times B)$$

4. أجرِ عملية الضرب فيما يأتي ، أن امكن واذكر السبب في حالة تعذر اجراء عملية الضرب:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{ب.} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{أ.}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{د.} \quad \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ج.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ز.} \quad \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 5 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{هـ.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ح.} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{و.}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{5. إذا كانت}$$

بين صحة أو خطأ كل من العبارات الآتية مع ذكر السبب :

$$A \times (B+C) = A \times B + A \times C \quad \text{أ.}$$

$$(B+C) \times A = B \times A + C \times A \quad \text{ب.}$$

$$A \times (B+A) = A \times B + A^2 \quad \text{ج.}$$

$$A \times (B+C) = B \times A + C \times A \quad \text{د.}$$

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C) \quad \text{هـ.}$$

6. إذا كانت

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

فأثبت ان :

أ. $A^2 - 2A - 3I = 0$

ب. $B^2 - B + I = 0$

ج. $A \times B \neq B \times A$

7. إذا كانت

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

فأثبت ان : $A \times B = B \times A = I$ لاحظ ان $A \times B$ كل منها النظير الضربي للآخر.

[9 - 7] النظير الضربي للمصفوفة : Inveres of a Matrix

سنتناول هنا دراسة النظير الضربي للمصفوفة المربعة من النوع 2×2 فقط.

تعريف: (9 - 7)

النظير الضربي للمصفوفة A من النوع 2×2 إن وجدت مصفوفة B من النوع نفسه بحيث

$$A \times B = B \times A = I$$

حيث I المصفوفة المحايدة بالنسبة لعملية الضرب (أي مصفوفة الوحدة من النوع 2×2)

سنرمز للنظير الضربي للمصفوفة A بالرمز A^{-1} (أي ان $B = A^{-1}$)

تعريف (8-9) : محدد المصفوفة The Determinat Of Matrix

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

فان المقدار $a.d - b.c$ يسمى محدد المصفوفة A ويرمز بالرمز Δ او بالرمز Δ وتقرأ دلتا أي أن :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a.d - b.c$$

تجدر الإشارة الى انه المقدار $a.d - b.c$ هو عبارة عن حاصل ضرب العنصرين الواقعين على القطر الاساس في المصفوفة A مطروحاً منه حاصل ضرب العنصرين الواقعين على القطر الآخر . كما أن الخطين | لا يرمان للقيم المطلقة .

مثال 1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

إذا علمت ان

فاوجد

د. $B \times A$

ج. $A \times B$

ب. محدد B

أ. محدد A

ماذا تستنتج من الفرعين ج ، د .

الحل :

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 0 \times (-6) = 6 \quad \text{محدد } A \quad \text{أ.}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} - 0 \times 1 = \frac{1}{6} \quad \text{محدد } B \quad \text{ب.}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A \times B \quad \text{ج.}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = B \times A$$

نستنتج من الفرعين جـ ، د أن كلاً من A ، B نظير ضربى للأخرى أي أن :

حسب تعريف (10-7) $A^{-1} = B$ ، $B^{-1} = A$

تعريف (9-9) :

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ فان النظير الضربى للمصفوفة A يكون موجوداً

(معروفاً) عندما تكون محدداً تساوي صفراً أي $(\Delta A \neq 0)$

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{\Delta} & \frac{-b}{\Delta} \\ \frac{-c}{\Delta} & \frac{a}{\Delta} \end{bmatrix}$$

ملاحظة :

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ وللحصول على A^{-1} (ان كان موجوداً) فيجب

* اتباع الخطوات الاتية لاجاده ويكون امراً سهلاً :

قبل كل شيء نجد قيمة Δ (محدد A) فاذا كانت $\Delta = 0$ فان A ليس لها نظير ضربى واذا كانت $\Delta \neq 0$ فان للمصفوفة A نظيراً ضربياً يتعين كالاتي :

- تبادل بين وضعي العنصرين الواقعين على القطر الاساس للمصفوفة A .
- نغير كل من اشارتي العنصرين الواقعين على القطر الآخر للمصفوفة A .
- نضرب المصفوفة الناتجة بعد اجراء عمليتي أ ، ب بالعدد $\frac{1}{\Delta}$ فنحصل على A^{-1}

$$B = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} \text{ حيث } xy \neq 0, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

فأثبت ان لكل من A, B ، $A \times B$ نظير ضربى ثم أوجده ؟

الحل :

بالنسبة للمصفوفة A :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$$

∴ للمصفوفة نظير ضربى هو :

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

بالنسبة للمصفوفة B :

$$\Delta = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{vmatrix} = xy \neq 0$$

حسب نظرية الضرب

للمصفوفة نظير ضربى هو :

$$B^{-1} = \frac{1}{xy} \begin{bmatrix} y & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{x} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y} \end{bmatrix}$$

ان هذا يعني انه اذا كانت B مصفوفة قطرية عناصرها مغايرة للصفر فان نظيرها مصفوفة قطرية أيضاً عناصر قطرها هي مقلوب عناصر القطر في B .

بالنسبة للمصفوفة $A \times B$:

$$A \times B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x & 0 \\ 0 & 4y \end{bmatrix}$$

ولما كانت $A \times B$ مصفوفة قطرية قطرها مغايراً للصفر فإن :

$$(A \times B)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3x} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4y} \end{bmatrix}$$

تحقق بنفسك ان :

$$(A \times B)^{-1} (A \times B) = (A \times B) (A \times B)^{-1} = I$$

مثال 3

أي من المصفوفات الآتية لها نظير ضربي ثم أوجده :

$$\begin{bmatrix} 12 & 20 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{أ} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ب} \quad \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{ج} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{د}$$

الحل: أ. لهذه المصفوفة نظير ضربي :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \quad \text{ب} \quad \therefore \text{لهذه المصفوفة نظير ضربي هو :}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{-3}{8} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} -5 & 5 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -5 \times 3 - 5 \times (-3) = 0 \quad \text{ج}$$

∴ ليس لهذه المصفوفة نظير ضربي .

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - (-1) \times 1 = 2 \neq 0$$

∴ لهذه المصفوفة نظير ضربي هو :

$$c^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & +1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 12 & 20 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 12 \times 5 - 20 \times 3 = 0$$

∴ ليس لهذه المصفوفة نظير ضربي .

مثال 4

إحسب قيم x التي تجعل المصفوفة الآتية ليس لها نظير ضربي

$$\begin{bmatrix} x & 3 \\ 12 & x \end{bmatrix}$$

الحل:

المصفوفة ليس لها نظير ضربي عندما تكون محددها صفراً أي :

$$\begin{vmatrix} x & 3 \\ 12 & x \end{vmatrix} = x^2 - 3 \times 12 = 0$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$\Rightarrow x = 6 , x = -6$$

10- 9] حل معادلات الدرجة الاولى في مجهولين باستخدام المصفوفات :

إذا أعطينا نظام المعادلتين :

$$ax + by = L$$

$$cx + dy = k$$

يمكن كتابتها بالصيغة المصفوفية :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L \\ k \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} L \\ k \end{bmatrix} \quad \text{فإذا فرضنا أن}$$

$$A \times B = C \dots\dots (1)$$

تسمى A مصفوفة المعاملات، B مصفوفة المجهولين، C مصفوفة الثوابت وإذا كانت المحدد $A \neq 0$ أي $\Delta = ad - bc \neq 0$ فمن الممكن إيجاد حل (1) كما يلي :

$$A^{-1} (A \times B) = A^{-1} \times C$$

$$(A^{-1} \times A) \times B = A^{-1} \times C$$

$$I \times B = A^{-1} \times C$$

$$B = A^{-1} \times C$$

بضرب طرفي (1) في A^{-1}

خاصية التجميع

من تعريف النظير A

لأن I عنصر محايد

من الواضح ان بمقدورنا الان إيجاد المجهولين x, y (الذين يشكلان حل نظام المعادلتين الاصليتين) بدلالة الثوابت العددية a, b, c, d, L, k .

حل نظام المعادلتين اللتين باستخدام المصفوفات ثم حقق النتائج:

$$2x + 5y = 1 \dots\dots (1)$$

$$3x + 7y = 2 \dots\dots (2)$$

الحل :

نكتب المعادلة المصفوفية

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ حيث } AX = C$$

$$A \text{ محدد } = \Delta = 2 \times 7 - 5 \times 3 = -1 \neq 0$$

$\therefore A$ لها نظير ويكون الحل $B = A^{-1} \times C$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$x = 3, \quad y = -1$$

التحقيق : بالتعويض المباشر في (2) ، (1) بقيمتي x, y نجد ان :

$$2 \times 3 + 5(-1) = 1$$

$$3 \times 3 + 7(-1) = 2$$

تعاريف (3-9)

1 جد التطوير الضربى لكل من المعطوفات الآتية كلما أمكن ذلك :

أ. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ب. $\begin{bmatrix} -3 & 9 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$ ج. $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ د. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

هـ. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ و. $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ز. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ح. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

2 اصطب قيم x التي تجعل كلا من المعطوفات الآتية ليس لها تطوير ضربي :

أ. $\begin{bmatrix} x & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ب. $\begin{bmatrix} 9 & x \\ & x \end{bmatrix}$ ج. $\begin{bmatrix} x & 4 \\ 2 & x^2 \end{bmatrix}$ د. $\begin{bmatrix} x^2 & 2 \\ 1 & x^2 \end{bmatrix}$

3 إذا كانت

$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

فأجب عما يلي :



- أ. اصطب خلا من
- ب. جد ناتج
- ج. جد ناتجهما
- د. تدفق من أن

$A^{-1} = B^{-1}$
 $A^{-1} + B^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$
 $(A + B)^{-1} = (A^{-1} + B^{-1})^{-1}$
 $(A^{-1})^{-1} = A$

4 حل نظام المعادلتين الآتيتين بالاشتراك (المصفوفات) كلما أمكن حتى تنتج النتائج :

$$3x - 4y = -5$$

$$3y - 5x = 1$$

ثانيا : المحددات

[9 - 11] محددات الرتبة الثانية واستخداماتها في حل معادلات المجهولين

إذا اعطينا نظام المعادلتين الاتيتين في مجهولين x, y :

$$ax + by = L \dots\dots (1)$$

$$cx + dy = k \dots\dots (2)$$

فان الاعداد a, b, c, d تسمى المعاملات ، أما العددين L, k فيسميان الثوابت تكون :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \text{محدد المعاملات ويرمز لها بالرمز } \Delta \text{ نلاحظ ان معاملات المجهول } x$$

$$\text{تكون العمود الاول للمحدد } \Delta, \text{ نسمي } \begin{vmatrix} L & b \\ k & d \end{vmatrix} \text{ محدد المجهول } x \text{ ونرمز لها بالرمز } \Delta x$$

$$\text{ونحصل عليها من } \Delta \text{ وذلك بعد الاستعاضة عن العمود الاول (معاملات } x) \text{ بالثوابت } L, k \text{ كما نسمي } \begin{vmatrix} a & L \\ c & k \end{vmatrix} \text{ محدد المجهول } y \text{ ونرمز له بالرمز } \Delta y \text{ وذلك بعد الاستعاضة عن}$$

العمود الثاني (معاملات y) بالثوابت L, K والآن بفرض ان $\Delta \neq 0$ فان قيمتي المجهولين x, y تحددان بالعلاقطين :

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} L & b \\ k & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{Ld - bk}{ad - bc}$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} a & L \\ c & k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{ak - cL}{ad - bc}$$

مثال 1

حل نظام المعادلتين الاثنتين باستخدام المحددات :

$$2x - 3y = -4 \quad , \quad 3x + y = 2$$

$$X = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-4 + 6}{2 + 9} = \frac{2}{11}$$

$$Y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{4 + 12}{2 + 9} = \frac{16}{11}$$

مثال 2

$$5X - 6Y = 0 \quad , \quad 3X + 4Y = 0$$

حل نظام المعادلتين :

$$X = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -6 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{0}{38} = 0$$

$$Y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{0}{38} = 0$$

مثال 3

حل نظام المعادلتين :

$$-3n = 4 - 3m \dots\dots (1)$$

$$6m + n + 4 = 0 \dots\dots (2)$$

الحل :

نضع المعادلتين بالشكل :

$$3m - 3n = 4$$

$$6m + n = -4$$

$$m = \frac{\Delta m}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{4 \times 1 - (-3)(-4)}{3 \times 1 - (-3) \times 6} = \frac{4 - 12}{3 + 18} = \frac{-8}{21}$$

$$n = \frac{\Delta n}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3 \times (-4) - 4 \times 6}{3 \times 1 - (-3) \times 6} = \frac{-12 - 24}{3 + 18}$$

$$= \frac{-36}{21} = \frac{-12}{7}$$

تمارين (4 - 9)

1. احسب قيمة المحددات الآتية :

$$\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -7 & 13 \\ 13 & -7 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}$$

2. جد حل كل من أنظمة المعادلات الآتية باستخدام المحددات :

a. $x + 2y = 0$

$2x - 3y = 1$

b. $-3x - 5y = -1$

$x + 6y = 3$

c. $2x = 3y + 4$

$5y = -4x - 1$

d. $6L - 7k = 0$

$4L + 3k = 0$

ثم استخدم المصفوفات لحل أنظمة المعادلات المذكورة في سؤال (2) .

3. جد قيمة m التي تجعل لنظام المعادلات الآتية حلاً :

$x + 2y = 1$

$3x + my = 4$

4. اثبت ان المبادلة بين صفي محدد من الدرجة الثانية يغير من اشارتها فقط اي انه :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}$$

الفصل الأول

اللوغاريتميات

- [1-1] نبذة مختصرة عن اللوغاريتمات 5
- [1-2] الدالة اللوغاريتمية 6
- [1-3] خواص الدالة اللوغاريتمية 7
- [1-4] اللوغاريتمات العشرية 10
- [1-5] اللوغاريتمات الطبيعية 10
- [1-6] استخدام الآلة الحاسبة 12

الفصل الثاني

المتتابعات

- [2-1] المتتابعة كدالة وتعريف 19
- [2-2] الحد العام للمتتابعة 21
- [2-3] المتتابعة الحسابية 24
- [2-3-1] مجموع المتتابعة الحسابية 27
- [2-4] المتتابعة الهندسية 31
- [2-4-1] الحد العام للمتتابعة الهندسية 32
- [2-4-2] المتتابعة الهندسية اللانهائية 35

الفصل الثالث

القطوع المخروطية

- نبذة تاريخية 39
- مقدمة 40
- [3-1] الدائرة 41
- [3-2] معادلة الدائرة القياسية 41
- [3-2-1] معادلة الدائرة إذا مست احد المحورين أو كليهما 44
- [3-2-2] المعادلة العامة للدائرة 48
- [3-3] معادلة مماس الدائرة عند نقطة 51

الفصل الرابع

الدوال الدائرية

- [4-1] نبذة تاريخية 58
- [4-2] التطبيق اللاف 59
- [4-3] دالة الظل 63
- [4-4] دوال دائرية اخرى 68
- [4-4-1] تعريف 68
- [4-4-2] تعريف 68
- [4-4-3] تعريف 69
- [4-5] العلاقات بين الدوال الدائرية 70

- [4-6] الزوايا المنتسبة 73
- [4-7] قيم الدوال الدائرية للزاوية التي قياسها $(\theta -)$ 78
- [4-8] رسم منحنيات الدوال المثلثية 81

الفصل الخامس

الغاية والاستمرارية

- [5-1] جوار العدد 94
- [5-2] غاية الدالة 95
- [5-3] غاية الدوال الدائرية 104
- [5-4] الاستمرارية 109

الفصل السادس

المشتقات

- * نبذة تاريخية 114
- * [6-1] التفسير الهندسي للمشتقة 114
- * [6-2] تطبيقات فيزيائية على المشتقة 118
- * [6-3] قواعد المشتقة 128
- * [6-4] قاعدة السلسلة 134
- * [6-5] معادلة المماس للمنحني والعمود على المماس 138
- * [6-6] الاشتقاق الضمني 141
- * [6-7] مشتقات الدوال الدائرية 147

الفصل السابع

الهندسة الفضائية (المجسمة)

- [7-1] العلاقة بين مستويين في الفضاء 154
- [7-2] مبرهنة (1) 156
- [7-2-1] نتيجة 157
- [7-3] مبرهنة (2) 157
- [7-4] مبرهنة (3) 158
- [7-5] مبرهنة (4) 159
- [7-5-1] نتيجة 160
- [7-6] تعامد المستقيمتين والمستويات 163
- [7-7] مبرهنة (5) 167
- [7-7-1] نتيجة 168
- [7-8] مبرهنة (6) (الاعمدة الثلاثة) 169

الفصل الثامن

مبدأ العد والتباديل والتوافيق

- [8-1] مبدأ العد 176
- [8-1-1] رمز المضروب 178
- [8-2] التباديل 179
- [8-2-1] قوانين التباديل 179
- [8-3] التوافيق 182
- [8-3-1] قوانين التوافيق 182
- [8-4] عدد طرق سحب عينة عناصرها (r) من مجموعة عدد عناصرها (n) 184
- [8-5] نسبة الاحتمال 191
- [8-5-1] قوانين الاحتمالات 191

الفصل التاسع

المصفوفات

- [9-1] التعريف العام للمصفوفة 197
- [9-2] تعريف المصفوفة 198
- [9-3] تعريف [تساوي مصفوفتين] 201
- [9-4] بعض المصفوفات الشهيرة 201
- [9-5] جمع المصفوفات وضربها بعدد حقيقي 203
- [9-5] تعريف 204
- [9-6] نظير المصفوفة بالنسبة لعملية الجمع 205
- [9-7] النظير الضربي للمصفوفة 217
- [9-8] تعريف محدد المصفوفة 218
- [9-9] تعريف 219
- [9-10] حل معادلات الدرجة الأولى في مجهولين باستخدام المصفوفات 223
- [9-11] محددات الرتبة الثانية باستخدامها في حل معادلات المجهولين 226
- الفهرس 230